

Bilag C

Natura 2000-væsentlighedsvurdering

NOVEMBER 2024
THYBORØN HAVN

UDDYBNING AF DELOMRÅDE S6 I SÆLHUNDEHOLM LØB

NATURA 2000-VÆSENTLIGHEDSVURDERING

ADRESSE COWI A/S

Visionsvej 53

9000 Aalborg

TLF +45 56 40 00 00

FAX +45 56 40 99 99

WWW cowi.dk

NOVEMBER 2024
THYBORØN HAVN

UDDYBNING AF DELOMRÅDE S6 I SÆLHUNDEHOLM LØB

NATURA 2000-VÆSENTLIGHEDSVURDERING

PROJEKTNR.

A246328

DOKUMENTNR.

A246328-1-DOK-020

VERSION

1.0

UDGIVELSESDATO

20-11-2024

BESKRIVELSE

Natura 2000-væsentligheds-
vurdering

UDARBEJDET

JUJR

KONTROLLERET

SMIN

GODKENDT

SUBN

INDHOLD

1	Indledning	7
1.1	Baggrund for projektet	7
1.2	Natura 2000-væsentlighedsvurdering	7
1.3	Dokumentationsgrundlag	8
2	Lovgrundlag	10
3	Projektbeskrivelse	12
3.1	Potentielle påvirkninger	12
4	Natura 2000-område N28	14
4.1	Udpegningsgrundlag	15
4.2	Målsætninger for Natura 2000-område N28	17
5	Natura 2000-væsentlighedsvurdering	19
5.1	Vurdering af marine habitatnaturtyper	19
5.2	Vurdering af marine arter	30
5.3	Vurdering af fugle	39
5.4	Opsummering vandområdeplanerne	50
5.5	Vurdering af målsætninger	51
6	Konklusion	54
7	References	55

BILAG

Appendix A Vandområdeplanerne

- A.1 Lovgrundlag
- A.2 Potentielle påvirkninger
- A.3 Eksisterende forhold i projektområdet
- A.4 Vurdering af vandområder
- A.5 Opsummering

Appendix B Havstrategidirektiv

- B.1 Lovgrundlag og afgrænsning
- B.2 Potentielle påvirkninger
- B.3 Deskriptorerne i Havstrategien
- B.4 Opsummering af relevante deskriptorer ift. uddybningen jf. Havstrategidirektivet
- B.5 Påvirkning af relevante deskriptorer i anlægs - og driftsfase af uddybningen
- B.6 Samlet konklusion for vurdering af Havstrategien

Appendix C Bilag IV-arter

- C.1 Marsvin
- C.2 Hvidnæse
- C.3 Øresvin
- C.4 Vågehval

1 Indledning

Der søges om tilladelse til at uddybe S6 delområdet, for at opnå en vanddybde på de ønskede -12,05 m DVR90 og en bredde på 110 m. I forbindelse med ansøgning om uddybning af delområde S6 i Sælhundeholm Løb, vurderes projektets indvirkninger på de marine naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget i Natura 2000-område nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Endvidere foretages vurdering af områdets relevante bilag IV-arter, vandområder samt Havstrategien.

1.1 Baggrund for projektet

Den 10. november 2022 modtog Thyborøn Havn "Tilladelse til udvidelse af Thyborøn Havn, etape 4" fra Trafikstyrelsen (2022-049710). Tilladelsen omfatter uddybning til kote -11,3 m DVR90 ved Limjordskaj 1 og 2.

Forud for denne tilladelse modtog Thyborøn Havn "Tilladelse til uddybning, og mindre forskydning, af sejlrende ved Thyborøn Havn, Lemvig Kommune" fra Kystdirektoratet (J.nr. 19/01631-41). Tilladelsen omfatter uddybning til kote -11,3 og -10,3 m DVR90 i S1 til S5 af sejlrenden ved Thyborøn Havn, samt forskydning af sejlrenden.

Uddybningsområdet er opdelt i 6 forskellige delområder (S1, S2, S3, S4, S5 og S6). Ansøgningen til Trafikstyrelsen handler om uddybning af S6 af en mængde på 142.000 m³.

En del af sedimentet fra delområderne S1 til S6 er allerede opgravet (450.000 m³), men med den nye udvidelse er der stadig 313.000 m³, der skal opgraves i S1 til S5 og 142.000 m³ i S6.

Kystdirektoratet er i gang med at sagsbehandle ansøgning om uddybning af S1 til S5 på de 313.000 m³.

1.2 Natura 2000-væsentlighedsvurdering

Delområde S6 i Sælhundeholm Løb, der søges om at blive uddybet, ligger omkring 1 km vest for den marine del af Natura 2000-område N28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø (MiljøGIS, 2024).

Ifølge Habitatbekendtgørelsen¹ kan der ikke lovligt gives tilladelse til at gennemføre projekter, hvis det medfører væsentlig negativ indvirkning på de arter og habitatnaturtyper, som et Natura 2000-område er udpeget for at beskytte eller at projektet forhindrer opfyldelse af målsætningerne i Natura 2000-området.

En vurdering af påvirkning af Natura 2000-områder indledes med en væsentlighedsvurdering. Denne har til formål, på basis af eksisterende informationer, at

¹ BEK nr. 1098 af 21/08/2023. Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Miljøministeriet.

vurdere, hvorvidt der er risiko for, at det ansøgte projekt kan medføre væsentlige negative påvirkninger af Natura 2000-området og de arter og naturtyper, som udgør grundlaget for områdets udpegning.

Hvis væsentlighedsvurderingen viser, at det ikke kan udelukkes, at anlægget kan medføre væsentlige påvirkninger af Natura 2000-områderne, vil ansøger være forpligtet til gennemføre en Natura 2000-konsekvensvurdering. Denne vurdering har omvendt bevisbyrde med særlig vægt på de forhold, der kan medføre væsentlig negativ indvirkning på Natura 2000-området.

Denne rapport beskriver resultaterne af en Natura 2000-væsentlighedsvurdering af uddybning af sejlrenden i delområde S6. Væsentlighedsvurderingen har haft til formål at vurdere:

- > Om projektet kan medføre væsentlige negative påvirkninger på de arter og naturtyper, som udgør grundlaget for områdets udpegning.
- > Om projektet vil forhindre, at naturtyper og arter på udpegningsgrundlagene opnår og/eller bevarer en gunstig bevaringsstatus.
- > Om områdets integritet vil bevares, hvis projektet gennemføres.
- > Hvis det ikke kan udelukkes, at projektet vil forårsage væsentlig negativ påvirkning af udpegningsgrundlaget, så vil en Natura 2000-konsekvensvurdering være påkrævet.

Desuden er det vurderet om projektet kan forhindre, at Vandområdeplanernes 2021-2027 målsætninger for området vil kunne opfyldes (Appendix A) og om projektet er i overensstemmelse med Havstrategien (Appendix B).

Endelig er projektets indvirkning på marine arter opført på Habitatdirektivets Bilag IV vurderet (Appendix C).

1.3 Dokumentationsgrundlag

Denne Natura 2000-væsentlighedsvurdering er baseret på informationer fra:

- > Rapporter og videnskabelig litteratur som refereret i teksten.
- > Natura 2000-basisanalyse 2022-2027 (revideret udgave). Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Natura 2000-område nr. 28. Habitatområde H28. Fuglebeskyttelsesområde F23, F27, F28 og F39 (Miljøstyrelsen, 2021).
- > Natura 2000-plan 2022-2027. Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Natura 2000-område nr. 28. Habitatområde H28. Fuglebeskyttelsesområde F23, F24, F28 og F39 (Miljøstyrelsen, 2023).
- > Basisanalyse for Vandområdeplan 2021-2027 (Miljøministeriet, 2023).

- > MiljøGIS (MiljøGIS, 2024).
- > Resultater af analyser af sedimentsammensætning og indhold af miljøfremmede stoffer i sedimentet i prøver, indsamlet i området både i forbindelse med denne udvidelse og ved tidligere projekter (Ansøgningens Bilag A og Bilag B) (COWI, 2024).
- > Resultater af tidligere hydrografiske modelleringer af strømforhold, kystudvikling og sedimentspredning i projektområdet gennemført i forbindelse med tidligere miljøvurderinger (Ansøgningens kapitel 6) (COWI, 2024).
- > Projektbeskrivelse (COWI, 2024)

2 Lovgrundlag

I dette kapitel beskrives lovgrundlaget for væsentlighedsvurderingen.

Natura 2000 er betegnelsen for et sammenhængende netværk af beskyttede naturområder i EU, der er udpegede for at bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Følgende direktiver og bekendtgørelser er relevante i relation til Natura 2000-screening og konsekvensvurdering:

- > Habitatdirektivet², der har til formål at fremme biodiversiteten i EU's medlemslande ved at definere en fælles ramme for beskyttelsen af naturtyper og arter, der er opført på direktivets bilag I (naturtyper) og bilag II (dyre- og plantearter) ved udpegning af særlige beskyttelsesområder, kaldet habitat-områderne. Desuden skal medlemslandene træffe de nødvendige foranstaltninger for at indføre en streng beskyttelsesordning i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der er nævnt i direktivets bilag IV.
- > Fuglebeskyttelsesdirektivet³ der har til formål at beskytte og forbedre vilkårene for vilde fuglearter i EU. Dette sker bl.a. ved at medlemslandene forpligter sig til at udpege fuglebeskyttelsesområder.
- > Habitatbekendtgørelsen⁴, der udgør en væsentlig del af implementeringen af habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne i dansk ret.
- > Lovbekendtgørelse nr. 692 af 26/05/2023 om miljømål mv. for internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven), der pålægger at staten skal udarbejde Natura 2000-planer og tilhørende basisanalyser.
- > EU's vandrammedirektiv (Direktiv 2000/60/EF) der fastsætter miljømål om "god tilstand" for at overfladevand og grundvand indenfor planperioden. EU's vandrammedirektiv er implementeret i lov om vandplanlægning (LBK nr. 126 af 26/01/2017) og en række bekendtgørelser, herunder bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand (BEK nr. 796 af 13/06/2023).

Ifølge habitatbekendtgørelsen må der ikke gives tilladelse til projekter og aktiviteter, der kan medføre væsentlige påvirkninger af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.

² Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer.

³ Rådets direktiv 2009/147/EF, om beskyttelse af vilde fugle med senere ændringer.

⁴ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21/08/2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Væsentlighedsvurderingen er udarbejdet i overensstemmelse med habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, hvorefter planer og projekter, der ikke direkte er forbundet med eller nødvendige for Natura 2000-områdets forvaltning, skal underkastes en vurdering, om de kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Væsentlighedsvurderingen har til formål at vurdere, om det uden rimelig videnskabelig tvivl kan afvises, at det planlagte projekt i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan medføre væsentlige påvirkninger på disse Natura 2000-områder. Det vil sige, at det vurderes om projektet vil forringe bevaringsstatus eller forhindre opnåelse af gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte (udpegningsgrundlaget).

Det skal vurderes, om det forventede projekt kan påvirke et Natura 2000-områdes bevaringsmålsætninger væsentligt. Vurderingen skal fokusere på potentielle påvirkninger af de karakteristika og miljømæssige forhold, der kendetegner det konkrete Natura 2000-område og særligt de konkrete bevaringsmålsætninger for de arter og habitatnaturtyper, der er på områdets udpegningsgrundlag. Hvis væsentlighedsvurderingen ikke kan udelukke en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områderne, skal der udarbejdes en konsekvensvurdering.

En konsekvensvurdering skal undersøge om de forventede aktiviteter kan skade Natura 2000-områdernes integritet. Et områdes integritet består af de samlede økologiske strukturer, funktioner og processer og skal sikre, at det gør det muligt at opretholde de arter og habitatnaturtyper, der er på områdets udpegningsgrundlag.

Ved en konsekvensvurdering af påvirkninger på Natura 2000-områder gælder forsigtighedsprincippet. Hermed forstås, at det uden rimelig tvivl og på det bedst tilgængelige, videnskabelige grundlag kan udelukkes, at et projekt medfører skade på området.

De marine arter og habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne er i stor udstrækning afhængige af, at der opnås eller opretholdes en god økologisk tilstand og god kemisk tilstand i de specifikke vandområder under vandrammedirektivet. Dette sikres gennem vandområdeplanlægningen efter lov om vandplanlægning. De indsatser, der er fastlagt i de vandområdeplaner, som også er Natura 2000-områder, skal derfor betragtes som væsentlige bidrag til opnåelsen af målsætninger i Natura 2000-planerne for disse områder.

Habitatbekendtgørelsen rummer mulighed for fravigelse af forbuddet mod væsentlige påvirkninger, hvis der er bydende nødvendige og væsentlige samfundsmæssige interesser og hvis der ikke findes alternativer til det ansøgte og relevante afværgeforanstaltninger er taget i brug. Dette forudsætter dog, at der samtidig foreligger en fuldstændig vurdering af relevante alternativer og disses indvirkning på Natura 2000-områdets bevaringsmålsætninger.

3 Projektbeskrivelse

Se ansøgning om tilladelse til yderligere uddybning for projektbeskrivelse (COWI, 2024).

3.1 Potentielle påvirkninger

I det følgende beskrives potentielle påvirkninger forbundet med projektet, hvor der skal udgraves 142.000 m³, hvoraf det forventes af uddybningsmaterialet består af 93 % postglacialt ler ("Agger ler") overlejret af 7% marint sand, se afsnit 5 i projektbeskrivelsen (COWI, 2024). Varigheden af uddybningen er estimeret til at vare op til 24-28 dage, med et uddybningsfartøj. Det vurderes, at der maksimalt vil spildes 5% af det uddybede materiale i S6 svarende til 7.100 m³. Oprensningsmængden i delområde S6 svarer til yderligere 10.000 m³ sediment om året, der tillægges den i forvejen oprensningsmængde på 130.000 m³ (COWI, 2024).

På baggrund af ovenstående er der identificeret følgende potentielle påvirkninger for projektet:

- > Ophvirvling af sediment, sedimentspild, og efterfølgende sedimentation ved uddybningen af sediment.
- > Frigivelse af næringsstoffer og miljøfarlige forurenende stoffer, når havbundssediment opgraves ved uddybningsarbejdet. Iltforbrugende stoffer vurderes ikke, da der er tale om meget lavt organisk indhold.
- > Undervandsstøj og luftbåren støj forårsaget af sandsuger og hydraulisk gravemaskine.

Spildt sediment kan påvirke marine naturtyper i suspenderet form og når det bundfældes på forskellig måde:

- > Bundfaunaorganismer kan påvirkes af forhøjede koncentrationer af suspenderet materiale i vandsøjlen og af sediment, der bundfælder.
- > I vækstsæsonen (maj til oktober) kan ålegræs påvirkes af skygning fra sedimentfaner, spildt og sedimenteret materiale.
- > Frigivelse af miljøfarlige forurenende stoffer fra sedimentet, der potentielt kan påvirke vandkvalitet og organismer.

Effekternes omfang er afhængigt af:


- > Hvilke habitater og organismer, der findes i udbredelsesområderne for sedimentfanerne, deres følsomhed overfor suspenderet, spildt og bundfældet sediment samt arternes re-koloniseringspotentiale.

- > Sedimentets kornstørrelser og dermed varigheden af, hvor længe sedimentet er i suspension.
- > Uddybningens varighed og intensitet.
- > Tidspunktet på året, hvor uddybningen foregår.

4 Natura 2000-område N28

Uddybningen af delområde S6 i sejlrenden er placeret ca. 1 km vest for Natura 2000-område N28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø (se Figur A-1). Natura 2000-området omfatter følgende habitat- og fugleområder:

- > Habitatområde H28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø.
- > Fuglebeskyttelsesområde F23 Agger Tange.
- > Fuglebeskyttelsesområde F27 Glumstrup Vig, Agersø, Munkholm og Kat-holm Odde, Lindholm og Rotholme.
- > Fuglebeskyttelsesområde F28 Nissum Bredning.
- > Fuglebeskyttelsesområde F39 Harboøre Tange, Plet Enge og Gjeller Sø.



Figur A-1 Natura 2000-områdets afgrænsning. Natura 2000-område nr. 28 består af habitatområde H28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø (grøn skravering) og fuglebeskyttelsesområde F23, F27 og F28 og F39 (orange skravering) (Miljøstyrelsen, 2021).

I lyset af projektets karakter og omfang vurderes det indledningsvist, at grundet afstand til projektområdet udelukkes væsentlige påvirkninger på fuglebeskyttelsesområderne F27 og F28 (se Figur A-1). Derfor er kun H28, F23 og F39, der er relevante ifm. vurdering af projektets påvirkninger på udpegningsgrundlaget i Natura 2000-området.

I de følgende afsnit beskrives områdets udpegningsgrundlag, biologiske forhold, bevaringsstatus og målsætninger for naturtyper og arter i Habitatområde H28 og Fuglebeskyttelsesområderne F23 og F39.

4.1 Udpegningsgrundlag

Tabel 4-1 viser udpegningsgrundlaget for Habitatområde H28 og Fuglebeskyttelsesområderne F23 og F39 i Natura 2000-området N28 Agger Tange, Nisum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø.

*Tabel 4-1 Habitatnaturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for Habitatområde H28 samt fugle for Fuglebeskyttelsesområde F23 og F39. For naturtyper betyder * en prioriteret naturtype og for fugle betyder (Y) ynglefugl og (T) trækfugl (Miljøstyrelsen, 2021).*

Udpegningsgrundlag	
H28 Agger Tange, Nisum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø	
Naturtyper	Sandbanke (1110) Vadeblade (1140) Lagune*(1150) Bugt (1160) Rev (1170) Strandvold med flerårige planter (1220) Kystklint/klippe (1230) enårig strandengsvegetation (1310) Strandeng (1330) Forklit (2110) Hvid klit (2120) Grå/grøn klit* (2130) Klithede* (2140) Havtornklit (2160) Grårisklit (2170) Klitlavning (2190) Kransnålalge-sø (3140) Næringsrig sø (3150) Brundvandet sø (3160) Vandløb (3260) Våd hede (4010) Tør hede (4030) Kalkoverdrev* (6210) Surt overdrev* (6230) Tidvis våd eng (6410) Hængesæk (7140) Kildevæld*(7220) Rigkær (7230)
Arter	Stavsild (1103) Gråsæl (1364) Spættet sæl (1365) Odder (1355) Blank seglmos (6216) Stor vandsalamander (1166)

Udpegningsgrundlag	
F23 Agger Tange	
Arter	<u>Ynglende (Y):</u> Rørdrum Almindelig ryle Brushane Dværgterne Splitterne Fjordterne Havterne Mosehornugle Rødrygget tornskade <u>Trækkende (T):</u> Skestork Pibesvane Grågå Lysbuget knortegås Spidsand Pibeand Krikand Taffeland Rørhøg Lille kobbersneppe <u>Ynglende og trækkende (TY):</u> Klyde, Hjejle.
F39 Harbøre Tange, Plet Enge og Gjeller Sø	
Arter	<u>Ynglende (Y):</u> Hvidbrystet præstekrave Almindelig ryle Brushane Dværgterne Fjordterne Mosehornugle Havterne <u>Trækkende (T):</u> Kortnæbbet gås Bramgå Lysbuget knortegås <u>Ynglende og trækkende (TY):</u> Klyde

Eftersom det ansøgte uddybningsprojekt foregår i Sælhundeholm Løbet (Thyborøn Havns sejlrende), er projektets forventede influensområde udelukkende af marin karakter. Væsentlige påvirkninger i delområde S6 i Sælhundeholm Løbet samt den vestlige del af Nissum Bredning, vil blive vurderet, mens væsentlige påvirkninger på land, i søer og vandløb kan udelukkes på forhånd. Derfor er terrestriske naturtyper, søer og vandløb samt terrestriske arter (blank seglmos (6216) og stor vandsalamander (1166) ikke medtaget i yderligere vurdering. Fuglearterne rødrygget tornskade, mosehornugle og rørhøg medtages ikke i vurderingen, da disse ikke er direkte tilknyttede marine områder, hvorfor væsentlige påvirkninger på ovenstående tre fuglearter udelukkes på forhånd.

4.2 Målsætninger for Natura 2000-område N28

I Natura 2000-planen for 2022-2027 er opstillet en række målsætninger for Natura 2000-område N28, som er relevante i relation til det ansøgte projekt.

De overordnede mål for Natura 2000-området er (Miljøstyrelsen, 2023):

- > Naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget skal bidrage til at opnå gunstig bevaringsstatus på biogeografisk niveau, og fugle på udpegningsgrundlaget skal bidrage til at sikre bestandsstørrelsen på nationalt niveau. Målet er, at områdets mange naturtyper domineret af hav- og kystnatur udgør et stort, sammenhængende naturområde med vægt på dynamisk kystudvikling og retablering af de hydrologiske og naturmæssige sammenhænge mellem havet og kysten, med velegnede, udbredte yngle- og rasteområder for hav- og kystfugle samt velegnede levesteder for områdets arter.
- > Fuglebeskyttelsesområderne sikres som internationalt vigtige, velegnede levesteder for udpegningsgrundlagets talrige yngle- og trækfugle, herunder områdets vidtstrakte strandenge, kystlaguner og småøer med Agger Tange og Harboøre Tange som kerneområde. Det er af international betydning, at der i området sikres velegnede levesteder for trækfuglene grågås, hjejle, kortnæbbet gås, krikand, lysbuget knortegås, pibeand, pibesvane og spidsand. Det er endvidere af national betydning, at der sikres velegnede levesteder for ynglefuglene almindelig ryle og brushane samt de kolonirugende ynglefugle fjordterne, havterne, klyde, dværgerterne og splitterne.
- > Områdets vidtstrakte marine naturtyper (1110, 1140, 1150, 1160, 1170) og kystnaturtyperne strandvold med enårige og flerårige planter (1210, 1220), kystklint/klippe (1230), enårig strandengsvegetation (1310) og strandeng (1330) sikres.
- > For områdets marine naturtyper sikres en rig bundvegetation og fauna, som bl.a. kan sikre fødegrundlaget for områdets fugle og pattedyr. Områdets sikres som et godt levested for den større forekomst af spættet sæl og gråsæl.
- > Områdets integritet sikres i form af en for naturtyperne hensigtsmæssig hydrologi og drift/pleje, en lav næringsstofbelastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder for arterne. Områdets integritet sikres derudover ved god vandkvalitet gennem reduceret tilførsel af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer, hvilket reguleres gennem vandområdeplanerne.

Konkrete målsætninger:

- > Den samlede forekomst af naturtyper, arter- og fugles levesteder i Natura 2000-området, uanset om de er kortlagt, skal være stabil eller i fremgang, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed for det.
- > For arter uden et tilstandsvurderingssystem er målet at bidrage til at opnå gunstig bevaringsstatus på biogeografisk niveau. Levestedernes tilstand

(vurderet i form af forekomst og udbredelse) og det samlede areal skal være stabilt eller i fremgang.

- > For ynglefugle uden tilstandsvurderingssystem er målet, at de skal bidrage til at sikre og øge bestanden på nationalt niveau. Levestedernes samlede areal og tilstand (vurderet i form af forekomst og udbredelse) skal være stabil eller i fremgang.
- > For trækfugle, der kan optræde med nationalt eller internationalt betydende forekomster i fuglebeskyttelsesområdet, skal deres raste- og overnatningsområder sikres eller være i fremgang således, at området også fremadrettet kan huse en bestand af national eller international betydning.
- > For de marine naturtyper skal tilstand og areal være stabile eller i fremgang og bidrage til gunstig bevaringsstatus på biogeografisk niveau.
- > For søer over 5 ha, vandløb og marine naturtyper henvises til målsætningerne i vandområdeplanerne (Miljøministeriet, 2023).

5 Natura 2000-væsentlighedsvurdering

De identificerede potentielle påvirkninger fra projektaktiviteterne er udelukkende marine (se afsnit 3.1), hvorfor Natura 2000-væsentlighedsvurderingen udelukkende vil foretages for marine naturtyper, arter, fugle og fisk der er på udpegningsgrundlaget.


En oversigt over de potentielle påvirkninger på de relevante udpegningsgrundlag er præsenteret i Tabel 5-1.

Tabel 5-1 Oversigt over potentielle påvirkninger på de relevante udpegningsgrundlag i Natura-2000 området N28.

Udpegningsgrundlag	Potentielle påvirkning
<u>Marine habitatnaturtyper</u> Sandbanke (1110) Vadeblade (1140) Kystlagune (1150) Bugt og vige (1160) Stenrev (1170)	> Direkte fysisk påvirkning > Sediment: udskygning ved spild, ophvirvling og sedimentering > Frigivelse af næringsstoffer og miljøfarlige forurenende stoffer
<u>Habitatarter</u> Gråsæl (1364) Spættet sæl (1365) Odder (1355) Stavsild (1103)	> Undervandsstøj og forstyrrelser > Sediment: mindsket sigtbarhed og øget partikelkoncentration ved ophvirvling og sedimentering (indirekte forstyrrelser af fødegrundlag)
<u>Fugle på udpegningsgrundlaget</u> Dværgterne (Y) Splitterne (Y) Fjordterne (Y) Havterne (Y) Pibesvane (T) Grågåse (T) Lysbuget knortegås (T) Kortnæbbet gås (T) Bramgåse (T) Spidsand (T) Pibeand (T) Krikand (T) Taffeland (T) Almindelig ryle (Y) Skestork (T) Rørdum (Y) Lille kobbersnepe (T) Klyde (TY) Hjejle (TY) Hvidbrystet præstekrave (Y)	> Støj (luftbåren) og forstyrrelser > Sediment: mindsket sigtbarhed ved ophvirvling og sedimentering (indirekte forstyrrelser af fødegrundlag)

5.1 Vurdering af marine habitatnaturtyper

Udbredelsen af marine naturtyper i H28 er vist på Figur A-1 og er domineret af bugter og vige (1160), efterfulgt af sandbanke (1110), stenrev (1170), kystlaguner (1150) og vadeblade (1140).



Figur A-1 Kortlagte marine habitatnaturtyper i Habitatområde H28 samt angivelse af projektområde. Hvor delområde S6 er markeret med rød.

Arealet af de kortlagte marine habitatnaturtyper er angivet i Tabel 5-2. Uddybningsområdet overlapper ikke med Natura 2000-området N28, men ligger i en afstand på omkring 1 km vest for habitatnaturtypen, bugter og vige (1160) (MiljøGIS, 2024).

Tabel 5-2 Areal af kortlagt marin habitatnaturtype i Natura 2000-området nr. 28 (Miljøstyrelsen, 2021).

Naturtype	Naturtype nr.	Kortlægningsår	Kortlagt (% samlet areal)
Sandbanke	1110	2012	3.356 ha (14,5%)
Vadeflade	1140	2004	250 ha (1,1%)
Kystlaguner	1150	2004	331 ha (1,4%)
Bugter og vige	1160	2004	18.313 ha (79,2%)
Stenrev	1170	2012	889 ha (3,8%)


Udover direkte fysisk påvirkning i overlappingsområdet, hvor fauna og flora vil dø ved opgravning, så er potentielle påvirkninger på de marine habitatnaturtyper omfattet af ophvirvling af sediment, efterfølgende udskygning og sedimentering. Habitatnaturtyperne kan også påvirkes ved frigivelse af næringsstoffer og miljøfarlige forurenende stoffer, når sedimentet opgraves og dernæst videreføres med strømmen (se oversigt over potentielle påvirkninger i Tabel 5-1).

Ifølge de overordnede målsætninger for Natura 2000-område N28, beskrevet i afsnit 4.2, skal områdets integritet sikres ved god vandkvalitet gennem reduceret tilførsel af næringsstoffer og miljøfarlige forurenende stoffer. Dette reguleres gennem vandområdeplanerne. Vurdering af vandområdeplanerne foretages i Appendix A og opsummeres i afsnit 5.4.

5.1.1 Eksisterende forhold

Thyborøn Kanal er en af de mest dynamiske lokaliteter på Jyllands vestkyst som følge af den betydelige udveksling af vand og sediment mellem Vesterhavet og Nissum Bredning (Limfjorden).

Den årlige gennemsnitlige nettotransport igennem Thyborøn Kanal er i omegnen af 1.230.000 m³ (3.370 m³ pr. dag) sediment fra Vestkysten mod Nissum Bredning (Petersen, 2017). Hovedparten af dette sediment aflejres på fjordgrundene i den vestlige del af Nissum Bredning og har gennem tid dannet et stort lavvandsområde, som gennemskæres af fire hovedløb: Sælhundeholm Løb mod syd, Juulsløb og Gåseholm Løb mod øst og Langholm Løb mod nord (Figur A-1).



Figur A-1 Til venstre: sedimenttransport igennem Thyborøn Kanal medfører sedimentfaneaflejring i den vestlige del af Nissum Bredning, der gennemskæres af fire hovedløb i henholdsvis nordlig, østlig og sydlig retning (Rambøll, 2020). Til højre: øjebliksbillede af sydgående strøm langs den jyske vestkyst og indgående indadgående strøm i Thyborøn Kanal. Numerisk beregnet strømfelt (DHI, 2009).

Strømforholdene i Thyborøn Kanal afhænger overordnet set af tidevandet og vindretning. I kanalen er indadgående strøm typisk kombineret med højvande, mens udadgående strøm forekommer sammen med lavvande. Ydermere vil vestlige vinde bevirke en indadgående strøm, mens sydøstlige vinde medfører udgående strøm. Den indadgående strøm nærmest spules ud over fjordgrundene og aflejrer i den forbindelse meget af det sediment, den bærer. Vandet fordeles herfra ud hovedløbene, primært Gåseholm Løb, Juulsløb og Sælhundeholm Løb, og drives videre ind i Nissum Bredning. Ud af Nissum Bredning er strømmen i højere grad henledt til løbene, og der optræder derfor betydeligt stærkere udgående end indgående strøm i løbene (Rambøll, 2004).

Den kystmorfologiske udvikling i området er beskrevet yderligere i ansøgningen i afsnit 3.1.2 (COWI, 2024).

Beskrivelser af naturtyper på udpegningsgrundlaget for habitatområde H28 følger forneden.

Bugter og vige (1160)

Bugter og vige er den mest dominerende marine naturtype i habitatområdet. På naturtypen findes en blød og siltet sandbund, som typisk er beliggende ved ikke-eksponerede kyster eller på dybere vand uden bølgeuro. Der forekommer også tomme skaller og enkelte spredte sten. I områderne med naturtypen findes typisk en række hvirvelløse dyr bl.a. søpunge, snegle, muslinger og søstjerner. Der er desuden fundet kutlinger samt fladfiskeyngel. Der er registreret spredte forekomster af ålegræs (Miljøstyrelsen, 2021).

Sandbanke (1110)

Sandbankerne i habitatområdet findes i den vestlige mundingsbarre inden for Agger Tange (Figur A-1 og Figur A-1). På den store barreform findes et væld af dynamiske bankestrukturer, som vedvarende er dækket af havvand. I den resterende del af Nisum Bredning findes jævnt fordelte revlesystem langs kysten som også karakteriseres som sandbanker. Sandbankerne forekommer på en vanddybde mellem 3-6 m, og der er registreret spredte forekomster af ålegræs specielt i den sydlige del af Krik Vig og syd for Sælhundeholm Løb (Figur A-1). Økologisk set er ålegræsbevoksninger særligt værdifulde områder, der er levested for en artsrig fauna. Epifaunaen på sandbankerne var domineret af søpunge, men der findes også søneller, søstjerner, slangestjerne, søpindsvin mfl. (Miljøstyrelsen, 2021). Generelt findes der begrænset vegetation og de få arter der findes som skulpetang, savtang, enkelte rødalger og kalkskorpealger er fåtallige (Miljøstyrelsen, 2021).



Figur A-1 Udbredelse af ålegræs i den vestlige del af Nisum Bredning, kort fra (DHI, Marine Vegetation Atlas , 2018).

Vadeflade (1140)

Vadeflade findes i et mindre område i Krik vig (Figur A-1), hvor naturtypen huser mange hvirvelløse dyr og er derfor et vigtigt fourageringsområde for vade-fugle (Miljøstyrelsen, 2021).

Kystlaguner (1150)

I området forefindes tre søer over 5 ha, der er kortlagt som laguner. Disse er Gjeller Sø og Sø nord for Gjeller Sø, som begge ligger ca. 10 km fra projektområdet samt Strandsø på Agger Tange. Derudover findes naturtypen også integreret i strandvolden på Agger Tange syd for Strandsø (Figur A-1). Arealerne på Agger Tange er helt eller delvist afskærmet fra havet af strandvolde og strandenge. Det forventes, at der forekommer en vis udveksling af vand i forbindelse med højvande for alle ovennævnte søer (Miljøstyrelsen, 2021).

Stenrev (1170)

I den dybe del af Nisum Bredning findes enkelte større, morfologisk højlæggende stenede områder langs nord- og sydkysten, der er udpeget som stenrev (Figur A-1). Faunadækningen på stenene var omkring 15% og domineret af søpunge og sønelliger, med få registreringer af søstjerner, eremitkrebs, muslinger og kutlinger. Mængden af makroalger er begrænset og har en dækningsgrad på ca. 1% og består kun af skulptetang (Miljøstyrelsen, 2021).

5.1.2 Vurdering

Der vil ikke være nogen direkte påvirkning af bundforholdene i Natura 2000-området N28, da uddybning i delområde S6 ikke overlapper med Natura 2000-området. Natura 2000-området N28 placeret ca. 1 km vest (MiljøGIS, 2024) for uddybningsområdet i delområde S6, hvorfor der kan være tale om indirekte påvirkninger af habitatnaturtyper og habitatarter på udpegningen via sediment-spild og efterfølgende sedimentspredning. Den opgravede mængde på 142.000 m³ forventes at medføre 5% spild og spredning af Agger ler overlejret af marint sand (COWI, 2024). Sand er hurtig-udfældende og forventes at bundfælde inden for en relativ lille afstand af 100 m (Kjørboe & Møhlenberg, 1982). Endvidere er der foretaget modellering af uddybningen af sand i Thyborøn Kanal, der viser det forbliver i sejlrendens nærområde (Rambøll, 2004). Det spildte ler vil enten sedimentere tæt ved opgravningsstedet (grundet lers kohæsive og flokkulerende egenskaber) eller suspenderes i vandfasen og bortføres med strømmen over større afstand, før det gradvist sedimenteres.

Tidligere modelleringer af spredningsmønstre af silt ifm. gravearbejde i projektområdets nærhed i Thyborøn Kanal, viser en small kystnær spredningsfane både i udgående nordvestlig retning samt indgående sydlig retning på vestsiden af Sælhundeholm Løb (se ansøgningen, afsnit 6.2.3 (COWI, 2024)). Finere sediment, som ler, kan ved indgående strøm forventes at sprede sig i en bredere fane i Thyborøn Kanal og den sydlige del af Krik Vig. Sedimentspredningsmodel-ler ifm. klapning i Thyborøn Kanal (klapplads Gåseholm 2) viser størstedelen af spredningen af f.eks. ler følger de overordnede strømningsmønstre ved indgående strøm, som hovedsageligt løber mod syd men også udover fjordgrundene i

mere vestlig retning mod de sydlige dele af Krik Vig (Figur A-1 og (Rambøll, 2020; COWI, 2008).

Uddybningsperioden i S6 varer i op til 24-28 dage med et uddybningsfartøj, og i denne periode vil der under indstrømning blive ført suspenderet ler mod Natura 2000-området og dertilhørende habitatnaturtyper. Som før nævnt er den naturlige daglige netto sedimenttransport, der finder sted igennem Thyborøn Kanal, på $1.230.000 \text{ m}^3/365 \text{ dage} = 3.369 \text{ m}^3/\text{døgn}$. Den reelle mængde suspenderet ler vil dog være betydeligt mindre, da leret også vil flokkulere og sedimentere i graveområdets umiddelbare nærhed. Ydermere vil den suspenderede andel også vil føres ud af Thyborøn Kanal f.eks. i forbindelse med lavvande og dertilhørende udgående strøm mod Nordsøen cirka to gange dagligt.

I de følgende vurderes påvirkningen af sedimentspredning på habitatnaturtyperne på udpegningsgrundlaget for H28.

Bugter og vige (1160)

Bugter og vige (1160) er den dominerende habitattype i Natura 2000-området (79,2%) og selvom ålegræs kan forekomme, er naturtypen domineret af blød siltet bund. Det ansøgte projektområde overlapper ikke med habitatnaturtypen, men der vil forekomme spredning af sand og ler i projektområdets umiddelbare nærhed (ca. 1 km), hvor tildækning også kan tildække bundfaunaorganismer. Her er der dog tale om midlertidigt tab af bundfaunasamfund, da det er erfaringen, at bundfaunasamfund i et turbulent område som ved Thyborøn Kanal og Sælhundeholm Løbet vil være genetableret efter 1-2 års forløb (Foden, Rogers, & Jones, 2011; Powilleit, Kleine, & Leuchs, 2006; COWI, 2001; Kiørboe & Møhlenberg, 1982). Grundet den kraftige naturlige dynamik i Thyborøn Kanal må det yderligere forventes, at biota såsom søpunge, snegle, muslinger, kutlinger og fladfiskeyngel er tilpasset høje sedimenteringsrater og generelt kraftig bunddynamik.

Samlet set vurderes det, at effekterne af uddybningen og oprensningen af det ansøgte projekt er begrænsede, hvorfor **væsentlige påvirkninger kan udelukkes** for udpegningsgrundlaget Bugter og Vige (1160) i Natura 2000-området nr.28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø.

Sandbanke (1110)

Sandbankerne i den sydlige del af Krik Vig er dækket af store forekomster af ålegræs. Ved højvande og indgående strøm er det sandsynligt at finkornet sediment (ler) føres ind over de sydligste dele af ålegræsbevoksninger i Krik Vig samt i den sydvestlige del af Nissum Bredning i forlængelse af Sælhundeholm Løb. Ålegræs forekommer spredt her i afstand med 2.5-5 km fra projektområdet i henholdsvis vestlig og sydlig retning (Figur A-1). Det forventes ikke, at ålegræs vil blive påvirket måleligt af udskygning fra sedimentfaner eller bundfældning. Denne vurdering er baseret på, at selv ud fra den mest konservative vurdering, er den naturlige sedimentering i området mere end 10 gange højere af hvad projektet forårsager. Derudover kan ålegræs overleve en hel måned med lysintensitet under artens minimumskrav (Erftemeijer & Lewis, 2006). Udgravningen forventes at vare op til 24-28 dage, men udskygningsforholdene vil ikke

tilnærmelsesvis være kritiske for ålegræs hverken syd eller vest for projektområdet grundet sedimentspredning. Den største mængde sediment forventes at blive ført mod syd, som ikke er omfattet af habitatområde H28 (Figur 5-1 og Figur 5-2). Anden flora og fauna på sandbanke omfatter søpung, sønelliger, søstjerner, slangestjerne, søpindsvin, kutlinger, skulptetang, savtang, rødalger samt kalkskorpealger, der alle vurderes til ikke at blive påvirket af den begrænsede sedimentering i forhold til hvad den naturlige dynamik er i området. Udover sedimentspredning vil frigivelse af kvælstof fra projektaktiviteterne, afhængigt af årstid (dvs. forhold som lys, temperatur og vandsøjles stratificering), medføre opblomstring, som også kan have udskyggende effekter på ålegræs. Frigivelsen af kvælstof behandles også i Appendix A ift. potentielle påvirkninger på Vandområdeplanernes kvalitetselementer (se opsummering i afsnit 5.4). En midlertidig frigivelse på 1,07 Tons kvælstof (jf. Tabel A-9 i Appendix A), vurderes ikke at have en væsentlig effekt på ålegræssets generelle forekomst i habitatområde H28 eller generelt i Nisum Bredning (Figur A-1).

Ud fra ovenstående betragtninger vurderes det at effekterne af uddybningen og oprensningen af det ansøgte projekt er begrænsede og **at væsentlige påvirkninger kan udelukkes** på Sandbanke (1110) i Natura 2000-området nr. 28 Agger Tange, Nisum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø.

Vadeflade (1140)

Naturtypen vadeflade findes mod vest for projektområdet i Nisum Bredning indenfor afstand af 1,5 km (MiljøGIS, 2024) og vil kun blive påvirket af lerede sedimentfaner ved nordgående strømretning. Biota på vadeflader forventes dog i særlig grad at være naturligt tilpasset høje partikkelkoncentrationer grundet habitatets lavvandede karakter og derved store naturlige eksponering for f.eks. bølger.

Denne tilpasning i kombination med den naturlige sedimentdynamik i området medfører, at det vurderes, **at væsentlige påvirkninger kan udelukkes** ved både uddybning og oprensning for Vadeflader (1140) i Natura 2000-området nr. 28 Agger Tange, Nisum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø.

Kystlaguner (1150)

De kortlagte kystlaguner i den sydlige del af H28 omkring Gjeller Sø har stor afstand (>10 km) til projektområdet i sydlig retning (MiljøGIS, 2024). Naturtypen forventes derfor ikke at blive påvirket af sedimentspredning ved højvande og indadgående strømretning. På Agger Tange findes naturtypen kystlagune få kilometer fra projektområdet. De dominerende indadgående strømretninger forventes dog ikke at føre sedimentfaner med ler i nordlig retning til Krik Vig og derved heller ikke til de områder, hvor vandudvekslingen ved højvande kan finde sted mellem Nisum Bredning og kystlagunerne på Agger Tange inkl. Strandsø. Derudover må det forventes, at vandudveksling mellem Nisum Bredning og kystlagunerne ofte er med høj sedimentkoncentration grundet f.eks. bølgeinduceret resuspension. Som for andre lavvandede habitater er fauna og flora i kystlaguner også tilpasset forhøjede partikkelkoncentrationer.

Øget sedimentering forårsaget af projektet vurderes derfor at være ubetydelig og det konkluderes **at væsentlige påvirkninger kan udelukkes** ved både uddybning og oprensning for Kystlaguner (1150) i Natura 2000-området nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø.

Stenrev (1170)

Stenrev er beliggende mere end 7 km fra projektområdet i østlig retning i Nissum Bredning (MiljøGIS, 2024). Uanset om strømretning er udad- eller indadgående vurderes det ikke, at stenrev vil blive påvirket af øget sedimentering fra projektet.

Det vurderes sammenfattende, **at væsentlige påvirkninger kan udelukkes** ved både uddybning og oprensning for stenrev (1170) i Natura 2000-området nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø.

5.1.3 Kumulative effekter

Uddybningen i Thyborøn Kanal (S1 til S5) – ansøgt hos Kystdirektoratet
Spredning af suspenderet sediment i forbindelse med uddybning- og oprensningsaktiviteter ved delområde S6 i Sælhundeholm Løbet kan påvirke de samme områder, som der påvirkes af uddybningen i Thyborøn Kanal (S1 til S5). Hvorved der kan forekomme kumulative effekter i form af højere sedimentkoncentrationer i vandsøjlen, der hvor sedimentfanerne overlapper.

Konklusionen fra ansøgningen indsendt til Kystdirektoratet er:

*"Det vurderes samlet, at ingen af habitatnaturtyperne i Natura 2000-området vil blive påvirket væsentlig af skygning eller sedimenteret materiale som følge af uddybning og udvidelse af sejlrenden i Thyborøn Kanal. Generelt forventes påvirkningerne at være minimale i Natura 2000-området og af en karakter der ikke overstiger de naturlige dynamikker. Projektet vil ikke påvirke de overordnede eller konkrete målsætninger for de marine naturtyper. Det konkluderes derfor, at **væsentlige påvirkninger udelukkes** på de udpegede habitatnaturtyper i Natura 2000-område nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø."*

Kystfodring på den Jyske Vestkyst Agger og Harboøre Tanger

Spredning af suspenderet sediment i forbindelse med uddybning- og oprensningsaktiviteter ved delområde S6 i Sælhundeholm Løbet kan påvirke de samme områder, som der påvirkes af sandfodringen. Hvorved der kan forekomme kumulative effekter i form af højere sedimentkoncentrationer i vandsøjlen, der hvor sedimentfanerne overlapper.

De indvundne materialer fra oprensninger og bypass er inkluderet i sandfodringsmængderne, i forbindelse med (Rambøll, 2020) som indeholder resultaterne herfra bidraget fra det oprensede sand. Dette skyldes, at der i spredningsberegningerne er forudsat et indhold af silt på 10 %, og at alt fint materiale som

worst-case frigives i forbindelse med sandfodringen. Der er dermed taget højde for spildet fra oprensningen og uddybning i beregningerne af spildet ved sandfodringen.

Tabel 5-3 Vurdering af kumulative effekter i forbindelse med kystfodring på den Jyske Vestkyst Agger og Harboøre Tanger.

Habitatnaturtype	Yderlige suspenderet sediment	Vurdering
Bugter og vige (1160)	Nej, pga. afstand og placering.	Væsentlige påvirkninger kan udelukkes
Sandbanke (1110)	Ja	Det vurderes, at ålegræs heller ikke påvirkes selvom der samtidig forekommer kystfodring i området grundet afstand og placering. Væsentlige påvirkninger kan udelukkes
Vadeflade (1140)	Ja	Det vurderes, at bunddyr ikke påvirkes selvom der samtidig forekommer kystfodring i området grundet robustheden for de enkelte arter. Væsentlige påvirkninger kan udelukkes
Kystlaguner (1150)	Nej, pga. afstand og placering.	Væsentlige påvirkninger kan udelukkes
Stenrev (1170)	Nej, pga. afstand og placering.	Væsentlige påvirkninger kan udelukkes

Oprensning i sejlrenden til Thyborøn Agger færgeren

I forbindelse med at sejlrenden mellem Thyborøn Færgehavn og Agger Færgehavn oprenses, kan der forekomme en lille forhøjet sedimentkoncentration lige omkring sejlrenden. Der er tale om oprensning i sand og spredning vil være i et afgrænset område, se Figur 6-7 i ansøgningen (COWI, 2024), der viser uddybning af sejlrende til Limfjords Kaj 1 og 2.

Tabel 5-4 Vurdering af kumulative effekter i forbindelse med oprensning i sejlrenden til Thyborøn Agger færgeren.

Habitatnaturtype	Yderlige suspenderet sediment	Vurdering
Bugter og vige (1160)	Nej, pga. afstand og placering.	Væsentlige påvirkninger kan udelukkes
Sandbanke (1110)	Ja	Det vurderes, at ålegræs ikke påvirkes selvom der samtidig forekommer oprensning af færgens sejlrende grundet afstand og placering. Væsentlige påvirkninger kan udelukkes

Habitatnaturtype	Yderlige suspenderet sediment	Vurdering
Vadeflade (1140)	Ja	Det vurderes at bunddyr ikke påvirkes selvom der samtidig forekommer oprensning af færgens sejlrrende grundet robustheden for de enkelte arter. Væsentlige påvirkninger kan udelukkes
Kystlaguner (1150)	Nej, pga. afstand og placering.	Væsentlige påvirkninger kan udelukkes
Stenrev (1170)	Nej, pga. afstand og placering.	Væsentlige påvirkninger kan udelukkes

Anlæggelsen af Thyborøn Havn etape 3 og 4

Der vurderes ikke at forekomme sedimentspild i forbindelse med nyttiggørelse af sediment i forbindelse med udbygning af havnen.

Med hensyn til kumulative effekter i forbindelse med havneudvidelsen, så vil der i forbindelse med inddragelse af areal ske inddragelse af områder, hvor der kan forekomme bunddyr. Dette vil dog ikke være i nærheden af Natura 2000-områderne.

Tabel 5-5 Vurdering af kumulative effekter i forbindelse med anlæggelsen af Thyborøn Havn etape 3 og 4.

Habitatnaturtype	Yderlige suspenderet sediment / Inddragelse af områder med bunddyr	Vurdering
Bugter og vige (1160)	Nej, pga. afstand og placering	Væsentlige påvirkninger kan udelukkes
Sandbanke (1110)	Nej, pga. afstand og placering	Væsentlige påvirkninger kan udelukkes
Vadeflade (1140)	Nej, pga. afstand og placering	Væsentlige påvirkninger kan udelukkes
Kystlaguner (1150)	Nej, pga. afstand og placering	Væsentlige påvirkninger kan udelukkes
Stenrev (1170)	Nej, pga. afstand og placering	Væsentlige påvirkninger kan udelukkes

Oprensning af sejlrrende løb til vindmøller på fjordgrundende

I forbindelse med at der sker anlægsarbejde, kan det være nødvendigt at oprense sejlrrenderne til de enkelte møller. Der er tale om oprensning i sand og spredning vil være i et afgrænset område se Figur 6-7 i ansøgningen (COWI, 2024), der viser uddybningen af sejlrrende til Limfjords Kaj 1 og 2.

Tabel 5-6 Vurdering af kumulative effekter i forbindelse med oprensning af sejlrende løb til vindmøller på fjordgrundende

Habitatnaturtype	Yderlige suspenderet sediment	Vurdering
Bugter og vige (1160)	Nej, pga. afstand og placering	Væsentlige påvirkninger kan udelukkes
Sandbanke (1110)	Ja	Det vurderes at ålegræs ikke påvirkes selvom der samtidig forekommer oprensning af sejlrenderne til møllerne grundet afstand og placering. Væsentlige påvirkninger kan udelukkes
Vadeflade (1140)	Ja	Det vurderes at bunddyr ikke påvirkes selvom der samtidig forekommer oprensning af sejlrenderne til møllerne grundet afstand og placering. Væsentlige påvirkninger kan udelukkes
Kystlaguner (1150)	Nej, pga. afstand og placering	Væsentlige påvirkninger kan udelukkes
Stenrev (1170)	Nej, pga. afstand og placering	Væsentlige påvirkninger kan udelukkes

5.1.4 Delkonklusion

Det vurderes samlet, at ingen af habitatnaturtyperne i Natura 2000-området vil blive påvirket væsentlig af skygning eller sedimenteret materiale som følge af uddybning og oprensning af delområde S6 i Sælhundeholm Løb. Generelt forventes påvirkningerne at være minimale i Natura 2000-området og af en karakter der ikke overstiger de naturlige dynamikker. Projektet vil ikke påvirke de overordnede eller konkrete målsætninger for de marine naturtyper (se afsnit 5.5). Det konkluderes derfor, at **væsentlige påvirkninger udelukkes** på de udpegede habitatnaturtyper i Natura 2000-område nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø.

5.2 Vurdering af marine arter


På udpegningsgrundlaget for H28 findes gråsæl (1364), spættet sæl (1365), odder (1355) og stavsild (1103) der alle potentielt påvirkes af det ansøgte projekt (se afsnit 3.1).

5.2.1 Eksisterende forhold

Spættet sæl (1365)

Spættet sæl er den mest almindelige sælart i Danmark, og er udbredt i alle danske farvande dog mest kystnært hvor den går på land på uforstyrrede småøer, sandbanker, stenrev, holme og øer for at hvile, yngle eller skifte pels.

Den danske bestand er opdelt i fire forvaltningsenheder: Vadehavet, Kattegat, den vestlige Østersø og Limfjorden (DCE, 2024). Bestanden i den centrale del af Limfjorden udgør en selvstændig genetisk enhed, men i den vestlige del af Limfjorden forekommer en blanding af sæler fra både Limfjorden og Vadehavet. Mellem 2002 og 2012 steg antallet af spættet sæl i den vestlige Limfjord, men siden da er antallet faldet, og i 2022 taltes i den vestlige del af Limfjorden gennemsnitligt 350 individer. Over de sidste 5 år har vækstraten i den vestlige Limfjord været -8%, hvilket tyder på, at den spættede sæl nærmer sig den økologiske bæreevne i området (Miljøstyrelsen, 2021). Der fødes kun meget få unger i den vestlige del af Limfjorden. I 2022 blev der talt 10 unger, hvilket indikerer at der primært er tale om et rasteområde for sæler fra andre områder. Til sammenligning taltes 399 unger i den centrale Limfjord i 2022, hvor der mellem 2017 og 2022 har været optalt 550 individer i gennemsnit. Den vestlige Limfjord udgør derfor hovedsageligt et rasteområde for spættet sæl (DCE, 2024; Nationalpark Thy, 2019; Miljøstyrelsen, 2021).



Figur A-1 De hyppigst anvendte hvilepladser for spættet sæl nær projektområdet bestående af S6 samt NOVANA-målestation for bestandsopgørelse af sæler (Kortet er baseret på informationer fra Orbicon 2011).

På Agger Tange kan man stort set altid se sæler, der hviler sig på sandbanker øst og nordøst for Agger Færgehavn (Figur A-1). Hvilede spættet sæl kan også observeres på stranden mellem høfderne på Nordsø siden af Agger Tange. Der er

også registreret kolonier ved den sydlige del af Agger Tange tæt ved NOVANA-målestationen. Der findes spættet sæl fouragerende spredt over hele det marine habitatsområdet H28. Området ved Agger Tange er ikke en yngleplads for spættet sæl (DCE, 2024; Miljøstyrelsen, 2021).

Gråsæl (1364)

Gråsælerne er genindvandret i løbet af de sidste 20 år efter at have været udryddet i Danmark i ca. 100 år. I dag forekommer gråsæl fast på lokaliteter i Kattegat, Østersøen, Vadehavet og den vestlige Limfjord og er ligesom spættet sæl knyttet til kystnære farvande, hvor der er rigeligt med føde og uforstyrrede yngle- og hvilepladser. Gråsælen er generelt mere mobil og svømmer over større afstande end spættet sæl (Miljøstyrelsen, 2021).

I Danmark forekommer to adskilte populationer af gråsæler: Nordsøbestanden og Østersøbestanden. Nordsøbestanden har hovedudbredelse omkring Storbritannien og i det tyske og hollandske vadehav. Østersøbestanden har hovedudbredelse omkring Stockholm, Estland og det sydlige Finland (kaldet Østersøbestanden) (DCE, 2024). Den danske andel af Nordsøbestanden og Østersøbestanden er opgjort til hhv. ca. 500 og 1.000 individer for perioden 2016-2018. DCE har vurderet at begge bestande i Danmark har stærkt ugunstig bevaringsstatus (Miljøstyrelsen, 2021).

Siden år 2000 er forekomsten af gråsæler i Danmark i fremgang, og der er permanent gråsæler på hvilepladser i den danske Østersø, Kattegat, Vadehavet og den vestlige Limfjord. Genetiske undersøgelser viser, at unge og voksne individer i Kattegat repræsenterer sæler fra Nordsøen. Dette gælder antageligvis også gråsæler i den vestlige del af Limfjorden. Agger Tange er en af de nyeste lokaliteter for gråsæler i Danmark. De første individer blev talt i 2009 og bestanden er siden steget til lidt over 30 individer. Området ved Agger Tange er ikke en yngleplads for gråsæl sæl (DCE, 2024; Nationalpark Thy, 2019; Miljøstyrelsen, 2021).

Odder (1355)

Odderen lever i tilknytning til vandområder, og findes i såvel stillestående som i rindende vand. Arten kan findes i både saltvand og ferskvand, og foretrækker især uforstyrrede vandløb, søer, moser og fjordområder, med gode skjulesteder i form af tæt vegetation. I Natura 2000-området blev odder senest overvåget i 2017. Der blev registreret spor/ekskrementer efter odder på syv lokaliteter i området: ved Gudum Å (ved Remmer Strand), ved Kallerup Kær (vestkysten af Thyholm), ved udløbet af Egebjerg Bæk (østkysten af Thyholm), ved Mølodde dæmningen, ved Sinnerup Vejle, ved Glomstrup Vig og ved Boddum Vig. Alle disse områder ligger mere end 10 km fra projektområdet og er samme lokaliteter som ved tidligere optællinger i 2011 og en lokalitet mere end i 2004. Det vurderes, at arten benytter området i langt større grad end illustreret ved overvågningen, og ud fra områdets karakter med mange små vandløb, og uforstyrrede skjulesteder vurderes der at være gode forudsætninger for artens fortsatte forekomst i området (Miljøstyrelsen, 2021).

Stavsild (1103)

Stavsilden er en stimefisk, der lever i de frie vandmasser i havet og som gyder i større vandløb. I april-maj samles de gydemodne fisk nær kysten og i maj-juni vandrer de op til deres gydepladser i ferskvand, hvor de gyder i maj-juli. Efter gydningen vandrer fiskene tilbage til havet. Stavsilden er registreret overalt i danske farvande, dog hyppigst langs den jyske vestkyst nær havneanlæg f.eks. ved sluserne i Hvide Sande og Thorsminde. For 100-150 år siden var den almindelig i alle danske farvande, herunder også i Limfjorden, men gik herefter markant tilbage overalt. Stavsild er i dag karakteriseret som vidt udbredt i danske farvande men fåtalligt forekommende. I 1995 blev Stavsild registreret i Skals Å i Limfjorden men gydning er ikke dokumenteret. Der er ikke med sikkerhed påvist gydende stavild i hverken Danmark, Norge eller Sverige hvorfor den herskende opfattelse i dag er, at stavild ikke gyder i danske vandløb. Der er sporadisk registreret stavild i Limfjorden. I NOVANA-overvågningen søges der efter arten i de vandløb, hvor arten indgår i habitatområdernes udpegningsgrundlag (Krog & Carl, 2019).

5.2.2 Vurdering

Gråsæl (1364) og spættet sæl (1365)

I Thyborøn Kanal og i den vestlige del af Krik Vig, som udgør projektets primære influensområde, raster både gråsæler og spættet sæl ved Agger Tange og nærtliggende sandbanker i en afstand af ca. 400-1.200 m fra uddybningsområdet (Figur A-1, (MiljøGIS, 2024)). Studier af adfærdsændringer har vist at sæler generelt ikke reagerer på fartøjer i afstande på over 200 m (Richardson & Greene, 1995), hvorfor den øgede forekomst af udgravningsskibe, ikke betragtes som værende af betydning for hverken gråsæl eller spættet sæl. Derudover er Thyborøn Kanal og Sælhundeholm Løb kendetegnet ved en betydelig skibstrafik som f.eks. færgeoverfart på timebasis mellem Thyborøn og Agger Tange samt generel skibstrafik mellem Limfjorden og Nordsøen. Begge sælarters tilstedeværelse i området vidner derfor om en betydelig tilvænningssevne og tolerance overfor denne type skibstrafik i Thyborøn Kanal. For gråsæl er deres nye og øgede tilstedeværelse i området en stærk indikator for, at arten udviser tilpasnings til den lokale skibsaktivitet. Stor tilvænningssevne for spættet sæl kendes også fra anlægsprojekter som f.eks. Øresundsforbindelsen. Ved anlæggelsen heraf blev det dokumenteret at bestanden syd for Saltholmen, omkring 1.000 m fra Øresundsforbindelsen, ikke blev påvirket i anlægsfasen eller af efterfølgende trafik i driftsfasen (København og Malmø Kommune, 2015).

Ud fra ovenstående betragtninger vurderes det, at der **ikke vil være nogen væsentlige påvirkninger** ved både uddybning og oprensningen af sælerne i Natura 2000-området nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø grundet forøget skibstrafik i projektområdet.

Uddybning og oprensning vil også være forbundet med øget undervandsstøj, der udsendes, når sandsugerens/splittrammens bund åbnere samt generel skrue- og maskinstøj fra opsugnings- og uddybningsfartøjerne under sejlads. Støj oven vande, antages spættet sæl almindeligvis at være adfærdsmæssigt tolerant. Dog

findes der få faktiske studier og der foreligger ingen viden om effekten af undervandsstøj på gråsæler. Da gråsæler og spættet sæl er nært beslægtet, anvendes tærskelværdier for spættet sæl i den samlede videre vurdering (Energistyrelsen, 2023). Støjmålinger omkring uddybningsfartøjer viser, at slæbesuger og spandkædegravemaskine skaber bredbåndede lyde med en kildestyrke på op til SPL 190 dB re 1 µPa. Støjen ligger primært i frekvensområdet fra 80 Hz til 10 kHz (Robinson, et al., 2011; Reine, Clarke, & Dickerson, 2012). Sælernes vejledende høreområde ligger i frekvensområdet 40 Hz til 50 kHz (Energistyrelsen, 2023), hvorfor det kan konstateres at frekvensområdet for uddybningsfartøjernes støj ligger indenfor en begrænset del af sælernes frekvensområde. Modelleringer fra et sammenligneligt uddybningsprojekt i Grådyb i Vadehavet har vist, at selv ved fordoblet lydstyrke af hvad forventes fra ét uddybningsfartøj, kan midlertidig høreskade kun opnås for sæler som befinder sig i en afstand af 50-100 m fra lydkilden (COWI, 2023). Permanente høreskader forventes ikke ved denne type aktivitet uanset sælernes afstand til uddybningsfartøjerne.

Overordnet set vurderes det dermed, at der **ikke vil være nogen væsentlige påvirkninger** ved både uddybning og oprensning af hverken gråsæl eller spættet sæl i Natura 2000-området nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø grundet forøget undervandsstøj ifm. uddybning af delområde S6.

Suspenderet sediment og sedimentfaner kan mindske sælernes fourageringsmuligheder enten ved nedsat sigtbarhed eller fortrængning af byttedyr. Det må dog forventes at både sæler og byttedyr er tilpasset de dynamiske forhold i området (se afsnit 5.1.1) og selvom f.eks. pelagiske arter som sild og brisling er særlig sårbare overfor forhøjede koncentrationer af suspenderede partikler, så er bundlevende fisk som f.eks. fladfisk og tobis det ikke, da begge kan opholde sig nedgravet i sedimentet. Laboratorieforsøg har f.eks. påvist at fladfisk kan overleve i 14 dage med en partikelkoncentration på mere end tre gange det forventede efter et kraftigt stormvejr i Vadehavet (Keller & R, 2006). Derudover har både gråsæl og spættet sæl i høj grad også mulighed for fødesøgning andre steder end i Thyborøn Kanal, den sydlige del af Krik Vig og den vestlige del af Nissum Bredning, hvor sedimentfaner forventes at kunne forekomme. Det vurderes derfor, at i tidsperioden på de 24-28 dage, hvor uddybningen finder sted, at sælerne har alternative fødesøgningsmuligheder såfremt deres byttedyr fortrænges i projektområdets nærhed.

På baggrund af ovenstående **udelukkes væsentlige påvirkninger** ved både uddybning og oprensning på både gråsæl og spættet sæl på udpegningsgrundlaget i Natura 2000-området N28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø ifm. suspenderet sediment og spredningen heraf.

Odder (1355)

Odder er ikke registreret i det forventelige influensområde ved delområde S6 i Sælhundeholm Løbet. Støj fra byggeriet forventes derfor ingen nævneværdig betydning for odder, der foretrækker uforstyrrede vandløb, søer, moser og fjordområder med gode skjulesteder i form af tæt vegetation. Sådanne habitater forefindes ikke i nævneværdigt omfang i projekts nærhed eller influensområdet. Selvom odder forekommer i marine miljøer, så kan delområde S6 i


Sælhundeholm Løb ikke karakteriseres som værende af betydning for odder på udpegningsgrundlaget.

På baggrund af ovenstående **udelukkes væsentlige påvirkninger** ved både uddybning og oprensning på odder i Natura 2000-området N28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø.

Stavsild (1103)

Stavsild kan både blive påvirket ved kraftig støj samt høje partikelkoncentrationer ved sedimentspredning, der kan fortrænge fiskene. Artsspecifikke tærskelværdier for flugtadfærd kendes ikke for stavsild. Dog må det forventes, at arten er tilpasset relativt høje sedimentkoncentrationer, som de f.eks. oplever under deres gydevandring i vandløb. Tidligere modelleringer af sedimentspredning af finkornet materiale ifm. klaptilladelser i den vestlige del af Nissum Bredning har vist, at sedimentspredning potentielt kan fortrænge stavsild fra de midterste dele af Thyborøn Kanal, såfremt deres følsomhed overfor forhøjede partikelkoncentrationer er betydeligt lavere end antaget. Dog vil forhøjede partikelkoncentrationer afskære fiskene kystnært fra at flytte sig fra området, se projektbeskrivelse afsnit 3.1 (COWI, 2024). Såfremt støj og/eller sedimentfaner vil fortrænge stavsild, der skulle være til stede i Thyborøn Kanal, vil fiskene derfor have mulighed at vende tilbage, når forholdene tillader det. Støjgener fra udgravningen forventes dog ikke at være meget anderledes end fra det allerede eksisterende lydbillede i Thyborøn Kanal og Sælhundeholm Løb, som er påvirket af høj skibstrafik.

Ifølge (arter.dk, 2024) er der gjort 7 observationer af stavsild i de danske kystvande, hvoraf de nærmeste observationer til projektområdet i Løshundeholm Løb er gjort i Thorsminde, se Figur A-1. Stavsilden er hyppigst langs den jyske vestkyst nær havneanlæg f.eks. ved sluserne i Hvide Sande og Thorsminde (Miljøstyrelsen, 2021). Der er ikke med sikkerhed påvist gydende stavild i hverken Danmark, Norge eller Sverige, hvorfor den herskende opfattelse i dag er, at stavsild ikke gyder i danske vandløb (Krog, C. & Carl, H, 2019).



Figur A-1 Observationer af stavsild i danske farvande (arter.dk, 2024).

Fra ferskvand foreligger der kun mere end et hundrede år gamle beretninger om fangst af enkelte stavsild i Skals Å og Simested Å, der løber til Limfjorden, men om den har ynglet i disse vandløb vides ikke (Krog, C. & Carl, H, 2019).

I begyndelsen af 2014 (januar-marts) blev der i forbindelse med DTU Aquas trawlundersøgelser registreret juvenile stavsild tre steder: en stavsild på 11 cm blev i januar fanget på 44 meters vanddybde i den centrale del af Kattegat, en stavsild på 13 cm blev i februar fanget vest for Bornholm på 44 meters vanddybde, og flere stavsild på 16-17 cm blev i marts fanget sydøst for Bornholm på 68 meters vanddybde. Det kan og ikke udelukkes, at der er sket en forveksling med sardiner, for sardiner har flere gange været registreret som stavsild/majsild i de prøver, Fiskeatlasset har modtaget fra trawlundersøgelse (Krog & Carl, 2019).

Eftersom man stadig ikke med sikkerhed har påvist gydende stavild i hverken Danmark, Norge eller Sverige, og at arten ikke er registreret i området omkring Thyborøn (se Figur A-1), vurderes det, at arten højst sandsynligt ikke vil være tilstede i projektområdet og nærliggende områder. Hvis der måtte befinde sig stavsild i området, hvilket er usandsynligt, forventes uddybningen og oprensningen og dermed sedimentspredningen ikke at påvirke stavsildens indvandren i Nissum Bredning, da stavsild foretrækker lave vanddybder. Uddybningen samt oprensningen forekommer på dybere vand, og da strømmen er koncentret i de dybere dele af kanalen, vil koncentrationen af sedimentet i vandet også befinde sig i denne del af kanalen, se kapitel 4 i projektbeskrivelsen (COWI, 2024). I april/maj måned koncentrerer stavsilden

nær kysten for så at svømme ind i floddeltaer og videre op i større vandløb for at gyde (Krog, C. & Carl, H, 2019).

På baggrund af ovenstående **udelukkes væsentlige påvirkninger** på stavsilde ved både uddybning og oprensning i Natura 2000-området nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø.

5.2.3 Kumulative effekter

Uddybningen i Thyborøn Kanal (S1 til S5) – ansøgt hos Kystdirektoratet. Spredning af suspenderet sediment i forbindelse med uddybning- og oprensningsaktiviteter ved delområde S6 i Sælhundeholm Løbet kan påvirke de samme områder, som der påvirkes af uddybningen i Thyborøn Kanal (S1 til S5). Hvorved der kan forekomme kumulative effekter i form af højere sedimentkoncentrationer i vandsøjlen, der hvor sedimentfanerne overlapper.

Konklusionen fra ansøgningen indsendt til Kystdirektoratet er:

*"Det vurderes samlet, at ingen af habitatarterne i Natura 2000-området vil blive påvirket væsentlig af sedimenteret materiale som følge af uddybning og udvidelse af sejlrenden i Thyborøn Kanal. Generelt forventes påvirkningerne at være minimale i Natura 2000-området og af en karakter der ikke overstiger de naturlige dynamikker. Projektet vil ikke påvirke de overordnede eller konkrete målsætninger for arterne. Det konkluderes derfor, at **væsentlige påvirkninger udelukkes** på de udpegede habitatarterne i Natura 2000-område nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø."*

Tabel 5-7 Vurdering af kumulative effekter i forbindelse med uddybning og oprensning i delområderne S1 til S5 i Thyborøn Kanal

Marine arter	Yderlige suspenderet sediment/ Støj	Vurdering
Gråsæl (1364) og spættet sæl (1365)	Nej, pga. afstand og placering	Væsentlige påvirkninger kan udelukkes
Odder (1355)	Nej, pga. afstand og placering	Væsentlige påvirkninger kan udelukkes
Stavsild (1103)	Nej, pga. afstand og placering	Såfremt støj og/eller sedimentfaner vil fortrænge stavsilde, der skulle være til stede i Thyborøn Kanal, vil fiskene derfor have mulighed at vende tilbage når forholdene tillader det. Væsentlige påvirkninger kan udelukkes

Kystfodring på den Jyske Vestkyst Agger og Harboøre Tanger

Tabel 5-8 Vurdering af kumulative effekter i forbindelse med kystfodring på den Jyske Vestkyst Agger og Harboøre Tanger

Marine arter	Yderlige suspenderet sediment/Støj	Vurdering
Gråsæl (1364) og spættet sæl (1365)	Nej, pga. afstand og placering	Væsentlige påvirkninger kan udelukkes
Odder (1355)	Nej, pga. afstand og placering	Væsentlige påvirkninger kan udelukkes
Stavsild (1103)	Nej, pga. afstand og placering	Såfremt støj og/eller sedimentfaner vil fortrænge stavsild, der skulle være til stede i Thyborøn Kanal, vil fiskene derfor have mulighed at vende tilbage når forholdene tillader det. Væsentlige påvirkninger kan udelukkes

Oprensning i sejlrenden til Thyborøn Agger færgeren

Tabel 5-9 Vurdering af kumulative effekter i forbindelse med oprensning i sejlrenden til Thyborøn Agger færgeren

Marine arter	Yderlige suspenderet sediment/Støj	Vurdering
Gråsæl (1364) og spættet sæl (1365)	Nej, pga. afstand og placering	Væsentlige påvirkninger kan udelukkes
Odder (1355)	Nej, pga. afstand og placering	Væsentlige påvirkninger kan udelukkes
Stavsild (1103)	Nej, pga. afstand og placering	Såfremt støj og/eller sedimentfaner vil fortrænge stavsild, der skulle være til stede i Thyborøn Kanal, vil fiskene derfor have mulighed at vende tilbage når forholdene tillader det. Væsentlige påvirkninger kan udelukkes

Anlæggelsen af Thyborøn Havn etape 1 og 2

Det vurderes ikke, at der er kumulative effekter på marine arter i forbindelse med indbygning af sediment i forbindelse med havneudvidelsen.

Oprensning af sejlrende løb til vindmøller på fjordgrundende

Tabel 5-10 Vurdering af kumulative effekter i forbindelse med oprensning af sejlrende løb til vindmøller på fjordgrundende.

Marine arter	Yderlige suspenderet sediment/Støj	Vurdering
Gråsæl (1364) og spættet sæl (1365)	Nej, pga. afstand og placering	Væsentlige påvirkninger kan udelukkes
Odder (1355)	Nej, pga. afstand og placering	Væsentlige påvirkninger kan udelukkes
Stavsild (1103)	Nej, pga. afstand og placering	Såfremt støj og/eller sedimentfaner vil fortrænge stavsild, der skulle være til stede i Thyborøn Kanal samt på fjordgrundende, vil fiskene derfor have mulighed at vende tilbage når forholdene tillader det. Væsentlige påvirkninger kan udelukkes

5.2.4 Delkonklusion

Det vurderes samlet, at hverken gråsæler, spættet sæl, odder eller stavsild i Natura 2000-området vil blive påvirket væsentligt af støj over eller under vand eller ved sedimentspredning som følge af uddybning og oprensning af delområde S6 af Sælhundeholm Løb. Overordnet set forventes påvirkningerne ikke at være af en størrelsesorden som adskiller sig fra de naturlige dynamikker i området eller den eksisterende baggrundsstøj som arter på udpegningsgrundlaget har tilpasset sig til i kraft af deres nuværende tilstedeværelse. Projektet vil derfor ikke påvirke de overordnede eller konkrete målsætninger for de arter på udpegningsgrundlaget (se afsnit 4.2), hvor der blandt andet henvises til at området skal være et godt levested for både spættet sæl og gråsæl samt at arterne generelt skal have gunstig bevaringsstatus på biogeografisk niveau. Det konkluderes derfor, at **væsentlige påvirkninger udelukkes** ved både uddybning og oprensning på arter på udpegningsgrundlaget i Natura 2000-område nr. 28 Agger Tange, Nisum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø.

5.3 Vurdering af fugle

5.3.1 Eksisterende forhold

Projektområdet i Sælhundeholm Løb ligger inde bag Agger Tange med nord og Harboøre Tange mod syd (Figur A-1). Agger Tange udgør sammen med Krik Vig F23. Agger Tange er ca. 10 km lang og 1,5 km bred og et af Danmarks vigtigste vådområder for fugle. Tangen er rasteområde for ande- og vadefugle samt trækkende småfugle. Agger Tange består af en flere kilometer lang klitrække ud mod Vesterhavet. Øst for klitterne ligger en dæmning der er anlagt i 1954 og som danner grænsen til Limfjorden. Mellem klitterne og dæmningen ligger der en stor, fladvandet lagune sø, som er omgivet af rørskov, strandenge, sumpe, vader og hede. Flere andearter, vadefugle og terner yngler på Agger Tange og i

træktiden raster tusindvis af fugle på tangen, hovedsagelig ænder, gæs og vadefugle. De rastende vandfugle holder især til i lagunesøen, på de oversvømmede enge og i de lavvandede områder i Krik Vig, i den del af Limfjorden der ligger på den østlige side af dæmningen (DOF, 2024; Miljøstyrelsen, 2023; Miljøstyrelsen, 2021).

Harboøre Tange, Plet Enge og Gjeller Sø udgør F39 og er tilholdssted for store mængder af rastende trækfugle, især vadefugle og andefugle. Tangen er hævet havbund og derfor flad og lavtliggende. Der findes to store og flere små lavvandede brakvandslaguner. Omkring lagunerne og på begge sider af vejen, der ligger vest for lagunerne, er der strandenge med græssende kreaturer. Mellem de to store laguner ligger Knopper Enge. Øst for lagunerne er områder tilgroet med tagrør og buske, men adgang for kreaturer har de senere år skabt små fugtige engområder. Området er fredet, men der foregår en intensiv jagt i området fra september til januar. Flere arter af vadefugle og andefugle yngler på Harboøre Tange og i forår og efterår tiltrækker området store mængder af trækkende vandfugle, der især er knyttet til lagunerne, oversvømmede enge og lavvandede områder i Nisum Bredning. Plet Enge bruges af gæs som raste- og fourageringsområde på arealerne af stub- og kornmarker i vinter- og forårsmånederne. 'Gjeller Sø' er på 55 ha og har en maxdybde på 2,2 m. Søen er kortlagt som lagune, da der findes både ferskvands og marine arter. I basisanalysen er søen vurderet til at have ringe økologisk tilstand på grund af højt indhold af fytoplankton (DOF, 2024; Miljøstyrelsen, 2023; Miljøstyrelsen, 2021).

I de følgende afsnit vil eksisterende forhold for ynglende og trækkende fugle på udpegningsgrundlagene i F23 og F39 blive præsenteret. For lille kobbersnepe i F23 og hvidbrystet præstekrave samt bramgås i F39 er arterne ikke til stede i national eller international væsentlig forekomst. Disse tre arter er derfor udeladt fra i beskrivelserne i den reviderede basis analyse for Natura 2000-området (Miljøstyrelsen, 2021) og de vil ligeledes udelades fra at blive gennemgået for neden.

Dværgterne

Dværgterne er en ynglefugl i F23 (Agger Tange) og F39 (Harboøre Tange, Plet Enge og Gjeller Sø), der i forbindelse med gennemførelse af den seneste overvågning i 2019 blev registreret hhv. 9 og 3 ynglepar i de to områder. I 2005 blev der registreret 40 par. I F23 yngler arten normalt i den sydligste ende af Agger Tange ud mod havet, men i 2019 blev alle parrene registreret på en nyetablerede ø i Krik Vig. I F39 er det det højeste antal, der er registreret i perioden 2004-2019. Ynglefuglene havde i 2019 etableret sig på Gjeller Odde med 2 par og ved Hygum Nor med et enkelt par. Truslerne for ynglebestanden vurderes især at være risiko for prædation på ynglepladserne, og på Agger Tange desuden forstyrrelser fra menneskelig aktivitet (Miljøstyrelsen, 2021).

Splitterne

Splitterne yngler i Danmark på oftest på mindre øer og holme med lavere vegetation, ofte i tilknytning til hættemågekolonier. Arten er trækfugl, som overvinterrer langs Afrikas vestkyst. Største trussel for den danske ynglebestand vurderes at være prædation fra rovdyr og konkurrence og prædation fra måge. I F23

(Agger Tange) blev der i forbindelse med gennemførelse af den seneste overvågning i 2019 ikke registreret ynglepar. Der blev senest registreret ynglepar i F23 i 2015, hvor der blev optalt 30 par. Inden for overvågningsperioden 2004-2012 er der ikke registreret ynglepar i området, men flere år er store kolonier på flere hundrede par observeret i forbindelse med anden NOVANA-overvågning. Artens yngleforekomst i F23 vurderes således at være meget ustabil og svingende. I F23 er der kortlagt to levesteder for splitterne, hvor det ene levested er i god tilstand mens det andet er i moderat tilstand. Levestedet i god tilstand består af de to nordligste øer i lagunen (Miljøstyrelsen, 2021).

Fjordterne

Fjordterne yngler i kolonier på øer og holme langs kysten ofte i selskab med havterne eller hættemåge. Arten er trækfugl og overvintrer langs Vestafrikas kyster. Største trussel for den danske ynglebestand vurderes at være prædation på ynglepladserne samt tilgroning af de rovdysfrie yngleøer. I F23 (Agger Tange) og F39 (Harboøre Tange, Plet Enge og Gjeller Sø) blev der i forbindelse med NOVANA-overvågningen i 2019 registreret hhv. 48 og 37 ynglepar. Det vurderes, at der de seneste par år været en stor fremgang i bestanden af fjordterne i begge fuglebeskyttelsesområder, hvor fuglene har etableret sig sent på sæsonen. I F23 og F39 yngler fjordterne udelukkende på isolerede øer uden adgang for landlevende rovdyr. Levestederne for fjordterne tilgodeser generelt artens behov for at fastholde en ynglebestand i området, da vegetationsstrukturen og flere isolerede øer giver gode betingelser. Ynglebestanden vurderes dog at være negativt påvirket af prædation fra især landlevende rovdyr (Miljøstyrelsen, 2021).

Havterne

Havterne yngler i Danmark overvejende på små ubeboede øer og sandrevler med sparsom vegetation. Arten er trækfugl, som overvintrer i åbentvandsbæltet omkring Antarktis. Største trussel for den danske ynglebestand vurderes at være prædation fra rovdyr på ynglepladserne samt bortskylning af reder i forbindelse med ekstreme højvander i yngletiden. I forbindelse med gennemførelse af den seneste overvågning i 2019 blev der registreret 26 ynglepar F23 (Agger Tange) (Miljøstyrelsen, 2021). På Agger Tange yngler arten typisk på øerne i den nordlige lagune, men benytter også den store strandeng, færgelejet og kyststrækningen i den sydvestlige del af tangen. I F39 (Harboøre Tange, Plet Enge og Gjeller Sø) er havterne ny på udpegningsgrundlaget for området, og ynglebestanden er derfor ikke undersøgt i overvågningsperioden 2004-2012. I dette område yngler havterne på de samme småøer som fjordterne, klyde og evt. hættemåge, godt isoleret fra landlevende rovdyr. Levestederne for havterne tilgodeser generelt artens behov for at fastholde en ynglebestand i området, da vegetationsstrukturen og flere isoleret øer giver gode betingelser. Ynglebestanden vurderes dog at være negativt påvirket af prædation fra især landlevende rovdyr (Miljøstyrelsen, 2021).

Pibesvane

Pibesvane trækker mellem ynglepladserne på den arktiske tundra til og fra overvintringspladserne især i Holland gennem Danmark. I F23 (Agger Tange) har bestanden af pibesvane været fluktuerende i overvågningsperioden 2004-2017.

Arten findes primært på vandfladen i den store nordlige lagune på Agger Tange, hvor den fouragerer på bundplanter, men en del fouragerer også på dyrkede arealer i nærheden. Vandfladerne anvendes som raste- og overnatningslokalitet for fuglene, der sidst på dagen flyver til sikker og uforstyrret overnatning på vandet. Fuglene opholder sig typisk i området på gennemtræk i oktober og november og trækker videre inden vinterperioden. Trækperioden kan være meget variabel og derfor har fuglene somme tider kun et kortvarigt ophold på lokaliteten. Områdets karakter med enge og store lavvandede laguner tilgodeser generelt artens krav til føde, og dens krav om sikre og uforstyrrede raste- og overnatningslokaliteter vurderes at være sikret bl.a. via de eksisterende reservatbestemmelser. Der vurderes ikke umiddelbart at være trusler for artens forekomst i området (Miljøstyrelsen, 2021).

Grågås

Grågås er en udbredt ynglefugl i Danmark. Den danske ynglebestand suppleres i efteråret af trækfugle fra Norge, der trækker gennem Jylland og fugle fra Sverige, der trækker igennem Østdanmark. I F23 (Agger Tange) er bestanden af grågås nogenlunde konstant gennem den seneste overvågningsperiode 2010-2017. Arten anvender primært den store lagunesø på Agger Tange til overnatningsplads og især i det tidlige efterår ses den i store tal flyve mellem fourageringspladserne på dyrkede arealer uden for området og lagunesøen på Agger Tange. Områdernes karakter med store åbne vandflader tilgodeser sammen med de eksisterende reservatbestemmelser generelt artens behov for uforstyrret natterast, og der vurderes ikke umiddelbart at være trusler for artens forekomst i området (Miljøstyrelsen, 2021).

Kortnæbbet gås

Kortnæbbet gås yngler på Svalbard og overvintrer i Nordvesteuropa bl.a. Danmark, hvor den ofte ses fouragerende på marker og enge, overvejende i Vest- og Nordjylland, men de seneste år er arten i stigende grad registreret i Østdanmark. I F39 (Harboøre Tange, Plet Enge og Gjeller Sø) er bestanden af kortnæbbet gås faldende i optællingsperioden 2004-2017. Da arten er overvåget i januar og marts gælder det ifølge DCE, at større antal til tider benytter beskyttelsesområdet senere på foråret eller om efteråret. Arten opholder sig typisk i områderne ved Plet Enge, Sønderholm Enge og Harboøre Tange, hvor den primært fouragerer på områdernes græsarealer, stub- og kornmarker. Specielt landbrugsarealerne ved Plet Enge benyttes som fourageringsområde i vinter- og forårsmånederne. Områdernes strandenge og åbne vandflader anvendes som raste- og overnatningslokalitet for fuglene, der sidst på dagen flyver til sikker og uforstyrret overnatning på vandet. Områdernes karakter med mange strandenge og store åbne vandflader tilgodeser sammen med de eksisterende reservatbestemmelser generelt artens behov for føde og uforstyrret natterast, og der vurderes ikke umiddelbart at være trusler for artens forekomst i området (Miljøstyrelsen, 2021).

Lysbuget knortegås

Lysbuget knortegås yngler på Svalbard og Nordgrønland. I Danmark træffes de som træk- og vintergæster ved kystnære, lavvandede områder med undervandsvegetation og på strandenge, og den seneste årrække også på

landbrugsjorde nær kysterne. Limfjordsområdet er, samlet set, det vigtigste område for lysbuget knortegås i Danmark. I F23 (Agger Tange) har bestanden af lysbuget knortegås været faldende i perioden 2004-2017, hvorimod bestandene i område F39 (Harboøre Tange, Plet Enge og Gjeller Sø) har været nogenlunde stabile i samme periode. På Harboøre Tange raster og fouragerer de tilstedeværende fugle typisk på den sydlige del nær færgelejet, men de benytter også Krik Vig som raste- og fourageringsområde. Gæssene benytter givetvis Agger Tange som alternativt fourageringsområde til Harboøre Tange i F39, hvor der er en større og regelmæssige forekomst. Gæssene græsser primært på selve strandengene, men i mindre grad også på ålegræs, der ellers andre steder er hovedernæringskilde for gæssene. I F39 raster og fouragerer gæssene primært på engene ved Plet Enge og Sønderholm Enge, men de benytter også i stor strækning den sydlige lagune på Harboøre Tange. Områdernes karakter med mange strandenge og lavvandede laguner og fjordområder tilgodeser sammen med de eksisterende reservatbestemmelser generelt gæssenes behov for uforstyrrede raste-, fouragerings- og overnatningspladser. Der vurderes ikke umiddelbart at være trusler for gæssenes forekomst i området (Miljøstyrelsen, 2021).

Spidsand

Spidsand er en fåtallig ynglefugl, men en lokal talrig trækgæst i Danmark fra ynglepladserne nord og øst for Danmark. Spidsand lever af plantefrø og smådyr, der findes på lavt vand eller mudderflader. F23 (Agger Tange) er blandt de vigtigste danske områder for arten og her har bestanden af spidsand været ret stabil i overvågningsperioden 2004-2017. Arten ses i det tidlige forår, men de største antal træffes i efteråret indtil vinterens komme. Fuglene raster især i den store nordlige lagune og på de vådeste partier af engene på Agger Tange og fouragerer her primært på frø fra vandplanter. Områdets karakter med mange strandenge og store åbne vandflader tilgodeser sammen med de eksisterende reservatbestemmelser generelt artens behov for sikre og uforstyrrede raste- og fourageringsområder. Der vurderes ikke at være trusler for artens fortsatte forekomst i området (Miljøstyrelsen, 2021).

Pibeand

Pibeand er en meget fåtallig ynglefugl, men en almindelig og vidt udbredt trækgæst i Danmark fra ynglepladserne i det nordlige og nordøstlige Europa, Rusland og Sibirien. I milde vintre bliver et større antal pibeænder i Danmark gennem hele vinteren. Arten lever af plantemateriale, der findes på lavt vand eller på strandenge. Limfjordsområdet er blandt de vigtigste danske områder for arten. I F23 (Agger Tange) har bestanden af pibeand været relativt stabil, men med store svingninger årene imellem i perioden 2004-2017. Fuglene raster og fouragerer især på de lavvandede dele af lagunen på Agger Tange eller på de vådeste partier af engene forår og efterår, hvor arten overvejende fouragerer på vand- og strandengplanter. Områdets karakter med mange strandenge og lavvandede, uforstyrrede vandflader vurderes sammen med de eksisterende reservatbestemmelser at tilgodesartens behov for raste-, fouragerings- og overnatningspladser og der vurderes ikke umiddelbart at være trusler for artens forekomst i området (Miljøstyrelsen, 2021).

Krikand

Krikand er en fåtallig ynglefugl i Danmark og som trækfugl træffes arten ved de fleste egnede lokaliteter over hele landet. Fjordområderne i Vest- og Nordjylland er blandt de vigtigste danske områder for arten. I F23 (Agger tange) har bestanden af krikand været relativt stabil, men med større svingninger årene imellem i optællingsperioden 2004-2017. Fuglene raster og fouragerer især på de vådeste partier af engene og de lavvandede dele af lagunen på Agger Tange i forår, efterår samt i milde vintre og i vintermånederne. Områdernes karakter med store åbne vandflader tilgodeser sammen med de eksisterende reservatbestemmelser generelt artens behov for uforstyrret rast og fouragering, og der vurderes ikke umiddelbart at være trusler for artens forekomst i området (Miljøstyrelsen, 2021).

Taffeland

Taffeland er en forholdsvis almindelig ynglefugl i fersk eller brakvand i Danmark, men dog mest talrig i Østdanmark. I F23 (Agger Tange) har taffeland en relativ stabil forekomst med årlige svingninger i optællingsperioden 2010-2017. Artens ses hyppigt i den nordligste og dybeste del af lagunesøen på Agger Tange, hvor arten fouragerer på bundlevende snegle, vandplanter mv. Områdets karakter med store åbne vandflader tilgodeser sammen med de eksisterende reservatbestemmelser generelt artens behov for sikre og uforstyrrede raste- og fourageringsområder og der vurderes ikke at være trusler for artens fortsatte forekomst i området (Miljøstyrelsen, 2021).

Rørdrum

Rørdrum er tæt knyttet til lokaliteter med store vanddækkede rørskove ved søer, fjorde og vandløb. I begyndelsen af 1970'erne ynglede der 10-20 par i Danmark, men sidenhen er såvel ynglebestanden som udbredelsen øget markant. Ynglebestanden blev midt i 1990'erne opgjort til maksimalt 200 ynglepar, og bestanden har været stigende siden da og arten findes i dag over hele Danmark. I F23 (Agger Tange) er rørdrum dog ikke registreret som ynglefugl i overvågningsperioden 2004-2019. Tidligere, lige efter årtusindeskiftet, er der hørt enkelte paukende fugle om foråret, men det vurderes, at potentialet for en fast bestand er lille pga. rørskovens spredte forekomst på Agger Tange idet hovedparten af de våde dele af Agger Tange bliver afgræsset med kreaturer, der holder rørskoven nede til gavn for ynglende vadefugle. Det vurderes overordnet set, at der ikke lokalt er de store trusler i området mod arten som ynglefugl i F23 (Miljøstyrelsen, 2021).

Almindelig ryle

Almindelig ryle er som ynglefugl i Danmark repræsenteret af den underart, der ofte omtales som engryle. Arten yngler nu overvejende på kortgræssede strandenge. Ynglebestanden af almindelig ryle er i løbet af 1900-tallet gået tilbage, og den samlede danske ynglebestand i dag er formodentlig kun på omkring 140 ynglepar. Engrylen overvintrer i Vesteuropa. Arten har gennem en længere årrække været i tilbagegang og forekommer nu kun regelmæssigt på enkelte store strandengsområder i Vestdanmark og på Læsø. Med Vejlerne og Tipper-halvøen som de to klart vigtigste yngleområder, samt en lille bestand i Vadehavet og på Agger Tange. I fuglebeskyttelsesområde F23 (Agger Tange) og F39 (Harboøre

Tange, Plet Enge og Gjeller Sø) blev der i forbindelse med gennemførelse af den seneste overvågning i 2018 registreret hhv. 5 og 0 ynglepar. På Agger Tange yngler arten på engene syd og vest for den nordlige lagune og på Harboøre Tange blev den sidst registreret som ynglende i 2012. Manglende pleje (afgræsning) af engene for år tilbage og udtørring af engene i yngletiden vurderes at være hovedårsagen til, at arten er forsvundet fra dette tidligere kerneområde (Miljøstyrelsen, 2021).

Brushane

Brushane er en trækfugl der overvintrer i Sydeuropa og Vestafrika. I Danmark er antallet af ynglepar af brushane faldet med 90-95 % over de seneste 30 år, og den samlede danske ynglebestand, vurderes nu at være på ca. 50 ynglepar. Brushane yngler på forholdsvis kortgræssede ferskere dele af strandengene. De største trusler mod brushane er prædation samt tab af ynglehabitat pga. dens krav til vegetationshøjde og hydrologi. I F23 (Agger Tange) og F39 (Harboøre Tange, Plet Enge og Gjeller Sø) blev der i forbindelse med den seneste overvågning i 2018 registreret en enkelt ynglehun i hvert af de to områder. På Agger Tange har arten i perioden 2004-19 været relativt stabil med 1-3 ynglehunner. Arten yngler på engene omkring den nordlige lagune. På Harboøre Tange er arten næsten forsvundet fra området og ses nu kun som ynglefugl med års mellemrum. Brushane har også i dette område tidligere været en mere talrig ynglefugl. Tidligere tiders manglende pleje af engene vurderes at være en af hovedårsagerne til den lokalt markante tilbagegang på Harboøre Tange. Der kortlagt et enkelt levested for brushane på Agger Tange og fem levesteder for brushane på Harboøre Tange (Miljøstyrelsen, 2021).

Skestork

Forekomsten af skestork som trækfugl skal ses i nøje sammenhæng med artens forekomst som ynglefugl. Da ynglefuglene og de flyvefærdige unger efter endt yngletid ofte samles i ret store flokke på egnede fourageringslokaliteter ved eller lige omkring det tidligere ynglested. Her fouragerer fuglene i en periode inden de i løbet af efteråret trækker sydpå til overvintringslokaliteterne i Sydeuropa og Nordafrika. I takt med at ynglebestanden har været i markant positiv fremgang de seneste år, ses der helt naturligt også mange flere skestørke før og efter yngleperioden. Skestork ses årligt raste i pæne antal på Agger Tange i sensommeren og det tidlige efterår før fuglene under efterårstrækket flyver videre sydpå. Arten er hidtil ikke overvåget i det nationale overvågningsprogram, og det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at udtale sig om artens aktuelle forekomst i området. Områdets karakter med store lavvandede vådområder og store uforstyrrede engarealer tilgodeser generelt artens krav til en raste- og fourageringslokalitet i træktiden, og der vurderes således ikke at være trusler for artens fortsatte lokale forekomst (Miljøstyrelsen, 2021).

Klyde

Klyde findes udbredt over hele landet med undtagelse af Bornholm. Rederne placeres ofte på småøer, gerne hvor de er i sikkerhed for ræve og andre rovdyr. I F23 og F39 blev der i forbindelse med gennemførelse af den seneste overvågning i 2019 registreret hhv. 187 og 152 ynglepar, som er det største antal, der er registreret i disse fuglebeskyttelsesområder i perioden 2004-2019. Arten er

meget afhængige af yngleøer, der ligger godt isoleret mod landlevende rovdyr, en høj, stabil forårsvandstand samt afgræssede engarealer. Naturstyrelsen har både på Agger - og Harboøre Tange etableret isolerede yngleøer flere steder, hvilket straks har bidraget til den positive bestandsudvikling. I og med at der findes levesteder i god-høj tilstand i begge fuglebeskyttelsesområder vurderes det, at der er et godt grundlag for artens forekomst i området fremadrettet (Miljøstyrelsen, 2021).

Hjejle

Hjejlen er trækfugl, som overvintrer i Vesteuropa. Den danske ynglebestand af hjejle tilhører delbestanden lavlandshjejler. Hjejlen yngede i 1800-tallet talrigt, men er siden da gået stærkt tilbage pga. opdyrkning af heden hvor den yngede. Da der stadig findes store velegnede hede-arealer i Nord- og Vestjylland, har der givetvis også været andre faktorer der har haft indvirkning på artens tilbagegang. De seneste årtier er arten kun konstateret ynglende med års mellemrum og altid kun med et enkelt par på ganske få lokaliteter i landet. I F23 blev der i forbindelse med gennemførelse af den seneste overvågning i 2019 registreret 0 ynglepar hvorfor hjejlen må betragtes som ynglende meget uregelmæssigt på Agger Tange. Sidst der blev registreret ynglende hjejle på Agger Tange var i 2013, hvor der blev registreret et enkelt par. Arten er meget afhængig af lav vegetation på ynglepladsen og vil samtidig gerne have græsdækkede marker eller enge i nærheden til fouragering. Områdets store sammenhængende våde og tørre naturtyper giver gode ynglemuligheder for arten, og lokalt vurderes der ikke at være væsentlige, aktuelle trusler for artens yngleforekomst (Miljøstyrelsen, 2021).

5.3.2 Vurdering

Potentielle påvirkninger af fugle på udpegningsgrundlaget omfatter støj og forstyrrelser fra øget skibstrafik samt uddybning og oprensning. Derudover kan det potentielt forekomme indirekte forstyrrelser, da øget sediment i vandsøjlen midlertidigt kan fortrænge fødegrundlag eller besværliggøre visuel detektion af føde såsom fisk, krebsdyr og vandplanter (Tabel 5-1).

Støj

I litteraturen er der rapporteret effekter på ynglende gæs, svaner, vadefugle og andefugle ved støjniveauer der overstiger 42-68 dB (Anderson, Murphy, Jorgenson, Barber, & Kugler, 1992; Hirvonen, 2001). For rastende og fouragerende vadefugle, ænder og gæs er der påvist adfærdsforstyrrelser fra 70 dB (Anon, 2005; Goudie & Jones, 2004; Ward & Stehn, 1989). Modelling af støj-udbredelse ifm. andet anlægsarbejde nær Agger Tange, har påvist at kildestyrke på 107 dB fra anlægsmaskiner falder til 60 dB ca. 35 m fra arbejdssteder og til 55 dB i en afstand af ca. 50 m (NIRAS, 2015). Der vil forekomme støj, når sandsugerens/splittrammens bund åbner samt fra skrue og maskinstøj fra fartøjet under sejlads. Konservative overslagsberegninger med to sandsugerfartøjer tæt ved siden af hinanden, vil udsende støj i et omfang hvor grænseværdien på 70 dB overholdes i en afstand på ca. 120 m fra kilden (COWI, 2023). Agger Tange (F23) er det nærmest liggende fuglebeskyttelsesområde som for delområde S6 er beliggende med større afstand end 2,5 km fra uddybningsområdet (MiljøGIS,

2024). På baggrund af ovenstående vurderes støj derfor at forekomme lokalt omkring fartøjet og ikke i et omfang hvor f.eks. ynglende havterner eller klyder på sydspidsen af Agger Tange vil blive forstyrret. Ynglende fugle på sydspidsen af Agger Tange forventes også at være tilpassede støj både fra hyppig færgetrafik samt general skibstrafik i nærområdet i Thyborøn Kanal. De vigtigste raste-, fouragerings- og yngleområde på Agger Tange, som er tættest på projektområdet omkring den store lagune, har en afstand på mere end 2,5 km til projektområdet (Miljøstyrelsen, 2021). På Harboøre Tange og længere væk vurderes støj fra projektet ikke at udgøre nogen forstyrrelse.

På baggrund af ovenstående **udelukkes væsentlige påvirkninger** ved både uddybnings- og oprensningsaktiviteter på fugle på udpegningsgrundlaget forårsaget af støj i F23 og F39 i Natura 2000-området nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø.

Sedimentspredning

Som beskrevet i afsnittet med vurdering af habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget i Natura 2000-området (se afsnit 5.1.2) forventes det, at sedimentspredning vil finde sted og følge de overordnede strømmønstre i Thyborøn Kanal og vestlig del af Nissum Bredning. Antageligvis vil suspenderet leret sediment altså føres mod den vestlige og sydvestlige del af Nissum Bredning, ligesom det vil føres ud af Thyborøn Kanal mod Nordsøen afhængigt af tidevand og vindretning.

For habitatnaturtyperne Bugter og Vige (1160), Sandbanke (1110), Vadeblade (1140) og Kystlagune forventes ingen væsentlig påvirkning grundet sedimentspredning (se Afsnit 5.1.2), hvilket således heller ikke forventes for fødegrundlaget for de fugle, der fouragerer i disse naturtyper. Det er muligt, at sedimentspredning vil bevirke, at der i nogle områder (primært kystnært) langs Sælhundeolm Løb vil forekomme sedimentspredning i et omfang, hvor fouragering af fiskespisende fugle forhindres i begrænsede områder i en midlertidig tidsperiode.

Forneden følger gennemgang af de enkelte fuglearter på udpegningsgrundlaget samt vurdering af om de påvirkes ift. deres brug af området som raste-, fouragerings- eller yngleområde (Tabel 5-11).

Tabel 5-11 Oversigt over fugle på udpegningsgrundlaget samt hvordan de påvirkes af den forventede sedimentspredning i området.

Art	Vurdering
Dværgterne	Dværgterne lever fortrinsvis af fisk, som sild og brisling og som den fanger ved styrtdykning. Splitterne kan fouragere i Thyborøn Kanal eller i den vestlige del af Nissum Bredning. Som nævnt, kan der under uddybning optræde koncentrationer af suspenderet materiale som vil udløse flugtdadfærd pelagiske fiskearter såsom stavssild, sild eller brisling, ligesom sedimentering vil mindske fuglenes visuelle detektion af fødeemner. Fødemulighederne for splitterne vil dog ikke påvirkes af dette, da området som fiskene eventuelt midlertidigt fortrænges fra, er minimalt ift. dværgternens potentielle fourageringsråde som omfatter hele Nissum Bredning og andre dele af Limfjorden og nordsøen langs den jyske Vestkyst. Fuglene har således alternative fourageringsmuligheder i perioden hvor sedimentspredning vil finde sted i området.

Art	Vurdering
	På baggrund af ovenstående udelukkes væsentlige påvirkninger på arten ved både uddybning og oprensning.
Splitterne	Samme begrundelse som for dværgterne. På baggrund af ovenstående udelukkes væsentlige påvirkninger på arten ved både uddybning og oprensning.
Fjordterne	Samme begrundelse som for dværgterne. På baggrund af ovenstående udelukkes væsentlige påvirkninger på arten ved både uddybning og oprensning.
Havterne	Samme begrundelse som for dværgterne samt at yngleområder på syd-siden af Agger Tange allerede er tilvænnnet et vist niveau af trafik og støj. På baggrund af ovenstående udelukkes væsentlige påvirkninger på arten ved både uddybning og oprensning.
Pibesvane	Fouragerer primært på vandplanter i lagunen i den nordlige ende af Agger Tange eller på dyrkede marker. Projektet påvirker ikke sådanne områder. På baggrund af ovenstående udelukkes væsentlige påvirkninger på arten ved både uddybning og oprensning.
Grågås	Samme begrundelse som for pibesvane. På baggrund af ovenstående udelukkes væsentlige påvirkninger på arten ved både uddybning og oprensning.
Kortnæbet gås	Arten opholder sig typisk i områderne ved Plet Enge, Sønderholm Enge og Harboøre Tange, hvor den primært fouragerer på områdernes græsarealer, stub- og kornmarker. På baggrund af ovenstående udelukkes væsentlige påvirkninger på arten ved både uddybning og oprensning.
Lysbuget knortegås	Lysbuget knortegås bruger Agger Tange bruges som alternativt fourageringsområde til Harboøre Tange hvor der fourageres på ålegræs og større alger på lavt vand i fjordområder og på mudderflader samt på strandenge og opdyrkede areal. Projektet påvirker ikke sådanne områder. På baggrund af ovenstående udelukkes væsentlige påvirkninger på arten ved både uddybning og oprensning.
Spidsand	Spidsand raster især i den store nordlige lagune og på de vådeste partier af engene på Agger Tange og fouragerer her primært på frø fra vandplanter. Projektet påvirker ikke sådanne områder. På baggrund af ovenstående udelukkes væsentlige påvirkninger på arten ved både uddybning og oprensning.
Pibeand	Pibeand raster og fouragerer især på de lavvandede dele af lagunen på Agger Tange eller på de vådeste partier af engene forår og efterår, hvor den overvejende fouragerer på vand- og strandengplanter. Projektet påvirker ikke sådanne områder. På baggrund af ovenstående udelukkes væsentlige påvirkninger på arten ved både uddybning og oprensning.
Krikand	Fuglene raster og fouragerer især på de vådeste partier af engene og de lavvandede dele af lagunen på Agger Tange. Dette område påvirkes ikke af projektet. På baggrund af ovenstående udelukkes væsentlige påvirkninger på arten ved både uddybning og oprensning.
Taffeland	Artens ses hyppigt i den nordligste og dybeste del af lagunesøen på Agger Tange, hvor arten fouragerer på bundlevende snegle, vandplanter mv. Dette område påvirkes ikke af projektet. På baggrund af ovenstående udelukkes væsentlige påvirkninger på arten ved både uddybning og oprensning.
Rørdrum	Rørdrum er tilknyttet rørskove. Rørskove berøres ikke af projektet. På baggrund af ovenstående udelukkes væsentlige påvirkninger på arten ved både uddybning og oprensning.
Almindelig ryle	Almindelig ryle yngler på engene syd og vest for den nordlige lagune på Agger Tange – et område som ikke påvirkes af projektet. Derudover søger almindelig ryle fortrinsvis føde på vadearealer ved lavvande. Sådanne områder påvirkes ikke af projektet. Hvis fuglene fouragerer på

Art	Vurdering
	det lave vand i Sælhundeholm Løb, vurderes det, at fødegrundlaget ikke påvirkes væsentligt, idet bundfaunaen ikke forventes at vil blive væsentligt negativt påvirket. På baggrund af ovenstående udelukkes væsentlige påvirkninger på arten ved både uddybning og oprensning.
Brushane	Brushane yngler på engene omkring den nordlige lagune på Agger Tange – et område som ikke påvirkes af projektet. Derudover spiser brushane orme, små bløddyr, insekter og planter, som findes på marker og enge eller på mudderflader på lavt vand. Sådanne områder påvirkes ikke af projektet. På baggrund af ovenstående udelukkes væsentlige påvirkninger på arten ved både uddybning og oprensning.
Skestork	I træktiden kan skestork bruge lavvandede vådområder og uforstyrrede engarealer som raste og fourageringsplads. Sådanne områder påvirkes ikke af projektet. På baggrund af ovenstående udelukkes væsentlige påvirkninger på arten ved både uddybning og oprensning.
Klyde	Klyden yngler på etablerede øer og er afhængig af høj vandstand på vadeblader og afgræssede engareal, hvor den søger føde i form af små krebsdyr, dyndsnele, alger og lignende som den filtrerer fra vandet ved hjælp af næbbet. Sådanne områder påvirkes ikke af projektet. På baggrund af ovenstående udelukkes væsentlige påvirkninger på arten ved både uddybning og oprensning.
Hjejle	Hjejlen er afhængig af lav vegetation på ynglepladsen og vil samtidig gerne have græsdækkede marker, enge eller vadeblader i nærheden til fouragering. Sådanne områder påvirkes ikke af projektet. På baggrund af ovenstående udelukkes væsentlige påvirkninger på arten ved både uddybning og oprensning.

På baggrund af ovenstående **udelukkes væsentlige påvirkninger** ved både uddybning og oprensning på fugle på udpegningsgrundlaget forårsaget af sedimentspredning i F23 eller F39 i Natura 2000-området nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø.

5.3.3 Kumulativ effekt

De kumulative effekter kan være støj eller sedimentspredning.

Det vurderes, at der grundet afstand til kystfodring på Harbøre Tange og Agger Tange, sejlrenden mellem Thyborøn og Agger Færgehavn, havneudvidelsen samt sejlrenderne til vindmøller på fjordgrundene ikke vil være kumulative effekter pga. støj.

Mht. sedimentspredning kan der forekomme påvirkninger af områder i kanalen hvor føde til fuglene vil være begrænsede, det vurderes at fugle kan søge andre områder i nærheden, hvorfor begrænsningen af føde vil være minimal. Dette vurderes ligeledes at gælde for den kumulative effekt.

5.3.4 Delkonklusion

Det vurderes samlet, at fugle på udpegningsgrundlaget i Natura 2000-området nr. 28 ikke vil blive påvirket væsentligt af støj eller sedimentspredning som følge af uddybning og oprensning af delområde S6 i Sælhundeholm Løb. Overordnet

for de fleste rastende, fouragerende eller ynglende fugle befinder disse sig hovedsageligt i områder i en afstand, som medfører at hverken støj eller sediment påvirker fuglene eller deres fødeemner. Det forventes, at påvirkningerne under uddybningen og oprensningen ikke er af en størrelsesorden, der adskiller sig fra de naturlige dynamikker i området eller overskrider støjniveauer fra det i forvejen trafikerede område i Sælhundeholm Løb. Projektet vil derfor ikke påvirke de overordnede eller konkrete målsætninger for fugle på udpegningsgrundlaget (se afsnit 4.2), hvor der blandt andet henvises til at fuglebeskyttelsesområderne sikres som internationalt vigtige, velegnede levesteder med Agger Tange og Harboøre Tange som kerneområde. Ydermere, for træk- og ynglefugle er levesteder, raste og overnatningsområder ikke påvirket og det konkluderes, at **væsentlige påvirkninger udelukkes** ved både uddybning og oprensning på fugle på udpegningsgrundlaget i Natura 2000-område nr. 28 Agger Tange, Nisum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø.

5.4 Opsummering vandområdeplanerne

Af de konkrete målsætninger for Natura 2000-området fremgår det, at der for de marine naturtyper henvises til målsætningerne i vandområdeplanerne. Sikres vandkvaliteten indenfor vandområdeplanerne bidrager dette til at beskytte de marine habitatnaturtyper. Opnåelse eller opretholdelse af god vandkvalitet indenfor vandområdeplanerne bidrager dermed til en opfyldelse af målsætningerne i Natura 2000-området.

Vurderingen ift. vandområdeplanerne fremgår af Appendix A og opsummeres kort herunder.

Der er identificeret to vandområder (kystvand) med relevans for uddybning og oprensning i delområde S6 i Sælhundeholm Løb. Dette er vandområde 232 Nisum Bredning, som overlapper med uddybnings- og oprensningsområdet, delområde S6. Endvidere er det vandområde 133 Vesterhavet, nord som er tilstødende vandområde, som potentielt kan blive indirekte påvirket via sedimentspredning fra delområde S6. Vandområderne er omfattet af vandområdeplan for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn 2021-2027 (Miljøministeriet, 2023).

Af Miljøstyrelsens kortbilag (MiljøGIS) til vandområderne fremgår miljømål og tilstand (MiljøGIS, 2024). Kvalitetselementet med den laveste tilstandsklasse afgør den samlede økologiske tilstand for vandområdet. Skalaen for økologisk tilstand går fra dårlig-ringe-moderat-god-høj tilstand, mens skalaen for kemisk tilstand inddeles i god eller ikke-god kemisk tilstand, Tabel 5-12.

Tabel 5-12 Miljømål og tilstand for vandområde 232 Nissum Bredning.

Aspekt	232 Nissum Bredning	133 Vesterhavet, nord
Miljømål økologisk tilstand	God	God
Fytoplankton (klorofyl)	Ringe	Moderat
Rodfæstede bundplanter	Ringe	Ikke anvendelig
Bunddyr (bentiske invertebrater)	Moderat	God
Iltforhold	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig
Vandets klarhed	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig
Nationalt specifikke stoffer	Ikke-god	God
Samlet økologiske tilstand	Ringe	Moderat
Miljømål kemisk tilstand	God	God
Kemisk tilstand	Ikke-god (bly)	Ikke-god (BDE, octylphenoler og kviksølv)

Habitatområde H28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø overlapper med vandområderne 232 Nissum Bredning og 133 Vesterhavet, nord.

Det er i Appendix A konkluderet, at projektet ikke vil påvirke den økologiske og kemiske tilstand i vandområde 232 Nissum Bredning. Det er dog konkluderet, at uddybningen delområde S6 vil være til hinder for målopfyldelse i vandområdet 232 Nissum Bredning, da der allerede er et indsatsbehov for kvælstof.

Det konkluderes, at projektet vil påvirke den konkrete målsætning under Natura 2000-område nr. 28 for de marine naturtyper, hvor der henvises til målsætningerne i vandområdeplanerne. Det skyldes, at vandområdet, hvor Natura 2000-området er beliggende, vil påvirkes af frigivet kvælstof under uddybningen og oprensningen og der allerede er et indsatsbehov for næringsstoffet i vandområdet.

5.5 Vurdering af målsætninger

I nedenstående Tabel 5-13 gennemgås og vurderes de overordnede og konkrete målsætninger for Natura 2000-området baseret på ovenstående afsnit.

Tabel 5-13 Oversigt over målsætninger for Natura 2000-området N28 med tilhørende vurderinger.

Målsætninger	Vurdering
Naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget skal bidrage til at opnå gunstig	Det vurderes, at naturtyper og arter kan opnå gunstig bevaringsstatus samt at

Målsætninger	Vurdering
bevaringsstatus på biogeografisk niveau, og fugle på udpegningsgrundlaget skal bidrage til at sikre bestandsstørrelsen på nationalt niveau. Målet er, at områdets mange naturtyper domineret af hav- og kystnatur udgør et stort, sammenhængende naturområde med vægt på dynamisk kystudvikling og retablering af de hydrologiske og naturmæssige sammenhænge mellem havet og kysten, med velegnede, udbredte yngle- og rasteområder for hav- og kystfugle samt velegnede levesteder for områdets arter.	fugle kan bidrage til at sikre bestandstørrelsen på nationalt niveau, såfremt projektet gennemføres. Derudover vil naturtyperne i natura 2000-området fortsat være sammenhængende, dynamisk kystudvikling vil forekomme og området vil udgøre velegnede leveområder for arter samt velegnede yngle- og rasteområder for fugle.
Fuglebeskyttelsesområderne sikres som internationalt vigtige, velegnede levesteder for udpegningsgrundlagets talrige yngle- og trækfugle, herunder områdets vidtstrakte strandenge, kystlaguner og småøer med Agger Tange og Harboøre Tange som kerneområde. Det er af international betydning, at der i området sikres velegnede levesteder for trækfuglene grågås, hjejle, kortnæbbet gås, krikand, lysbuget knortegås, pibeand, pibesvane og spidsand. Det er endvidere af national betydning, at der sikres velegnede levesteder for ynglefuglene almindelig ryle og brushane samt de kolonirugende ynglefugle fjordterne, havterne, klyde, dværgterne og splitterne.	Fuglebeskyttelsesområderne, herunder Agger Tange og Harboøre Tange, vil fortsat være sikret som vigtige og udgøre velegnede levesteder for fugle på udpegningsgrundlaget såfremt projektet gennemføres.
Områdets vidtstrakte marine naturtyper (1110, 1140, 1150, 1160, 1170) (...) sikres.	Områdets vidtstrakte marine naturtyper vil ikke fragmenteres som følge af projektet.
For områdets marine naturtyper sikres en rig bundvegetation og fauna, som bl.a. kan sikre fødegrundlaget for områdets fugle og pattedyr. Områdets sikres som et godt levested for den større forekomst af spættet sæl og gråsæl.	Projektet udgør ingen risiko for de marine naturtypers bundvegetation og fauna og dermed fødegrundlaget for fugle og pattedyr. Projektet vil ikke påvirke området, som et godt levested for spættet sæl og gråsæl.
Områdets integritet sikres i form af en for naturtyperne hensigtsmæssig hydrologi og drift/pleje, en lav næringsstofbelastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder for arterne. Områdets integritet sikres derudover ved god vandkvalitet gennem reduceret tilførsel af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer, hvilket reguleres gennem vandområdeplanerne.	Det er vurderet, at projektet vil være til hinder for målpopfyldelse i vandområde 232 Nissum Bredning, hvor der er et indsatsbehov for kvælstof og da projektet frigiver kvælstof i forbindelse med uddybningen og oprensningen.
Den samlede forekomst af naturtyper, arter- og fugles levesteder i Natura 2000-området, uanset om de er kortlagt, skal være stabil eller i fremgang, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed for det.	Projektets påvirkninger vurderes ikke at være i et omfang som vil påvirke den samlede forekomst af arter eller fugles levesteder i Natura 2000-området uanset om de er kortlagt, hvorfor disse vil være stabile eller i fremgang såfremt projektet gennemføres.
For arter uden et tilstandsvurderingssystem er målet at bidrage til at opnå gunstig bevaringsstatus på biogeografisk niveau. Levestedernes tilstand (vurderet i form af forekomst og udbredelse) og det samlede areal skal være stabilt eller i fremgang.	Såfremt projektet gennemføres, vil der for arter uden tilstandsvurderingssystem fortsat kunne opnås gunstig bevaringsstatus på biogeografisk niveau. Levestederne samlede areal (forekomst og udbredelse) i natura 2000-området vil være stabil eller i fremgang såfremt projektet realiseres.

Målsætninger	Vurdering
For ynglefugle uden tilstandsvurderingssystem er målet, at de skal bidrage til at sikre og øge bestanden på nationalt niveau. Levestedernes samlede areal og tilstand (vurderet i form af forekomst og udbredelse) skal være stabil eller i fremgang.	Projektet vil ikke hindre at bestanden af ynglefugle på nationalt niveau i at være stabile eller i fremgang idet samlet areal, forekomst og udbredelse ikke vil påvirkes.
For trækfugle, der kan optræde med nationalt eller internationalt betydende forekomster i fuglebeskyttelsesområdet, skal deres raste- og overnatningsområder sikres eller være i fremgang således, at området også fremadrettet kan huse en bestand af national eller international betydning.	Realisering af projektet vil ikke påvirke raste- og overnatningsområder for trækfugle, der kan optræde med nationalt eller internationalt betydende forekomster.
For de marine naturtyper skal tilstand og areal være stabile eller i fremgang og bidrage til gunstig bevaringsstatus på biogeografisk niveau.	Realisering af projektet vil ikke ændre de marine naturtypers tilstand og areal på biogeografisk niveau.
For søer over 5 ha, vandløb og marine naturtyper henvises til målsætningerne i vandområdeplanerne (Miljøministeriet, 2023).	Projektet er vurderet under vandområdeplanerne, hvor der i vandområde 232 Nissum Bredning er et indsatsbehov for kvælstof. Projektet vil være til hinder for målopfyldelse, da der frigives kvælstof i forbindelse med uddybningen og oprensningen.

6 Konklusion

Samlet set vurderes det:

- > At uddybning og oprensning i delområde S6 af sejlrenden ind til Thyborøn Havn ikke vil medføre væsentlige negative påvirkninger på de arter og naturtyper, som udgør grundlaget for Natura 2000-område nr. 28 *Agger Tange, Nisum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø*. Dette er vurderet idet:
1) Der ikke er nogen direkte påvirkning i Natura 2000-området; 2) Habitat-naturtyperne på udpegningen, bliver ikke negativt påvirket grundet afstand samt at tilhørende fauna og flora er tilpasset påvirkninger af samme karakter og i betydeligt større omfang, end hvad forventes for projektet; 3) For gråsæler og spættet sæl forventes støjgener at være under grænseværdier for at blive betragtet som værende forstyrrende og da sælerne i området generelt er tilpasset skibstrafik af betydeligt omfang. Såfremt pelagiske fisk, som udgør fødeemner for sæler, fortrænges vil dette være midlertidigt og sælerne vil have rig mulighed for alternative fødeemner, som ikke påvirkes/fortrænges samt have adgang til alternative fødesøgningsområder i Krik Vig eller Nordsøen.
- > At projektet ikke vil forhindre, at naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget opnår og/eller bevarer en gunstig bevaringsstatus.
- > Overordnet vil projektet ikke være i strid med Natura 2000-områdets bevaringsmålsætninger og områdets integritet vil bevares. Dog vil projektet medføre udledning af kvælstof, som følge af uddybningen og oprensningen, hvilket vil være til hinder for målopfyldelse i vandområde 232 Nisum Bredning, hvor der er et indsatsbehov for kvælstof, se Appendix A.
- > At det ikke vil være nødvendigt at gennemføre en Natura 2000-konsekvensvurdering, da væsentlige påvirkninger kan udelukkes.

7 References

- Krog, C. & Carl, H. (2019). Stavsild. I: Carl, H. & Møller, P.R. (red.). Atlas over danske saltvandsfisk. *Statens Naturhistoriske Museum. Online-udgivelse*, .
- Alstrup et al. (2024). Further Evidence for Breeding White-Beaked Dolphin (*Lagenorhynchus albirostris*) in Inner Danish Waters. *Coasts*, 4(2), 226-234.
- Anderson, B., Murphy, S., Jorgenson, M., Barber, D., & Kugler, B. (1992). *GHX-1 waterbird and noise monitoring program. Effects of noise on wildlife*. Final Report, prepared for ARCO Alaska Biological Research Inc. Fairbanks and Acentech Inc, Canoga Park CA in.
- Anon. (2005). *Environmental Agency stated for the Humber Estuary Tidal defence Scheme*.
- arter.dk. (november 2024). Hentet fra <https://arter.dk/search/record-search?taxonIds=018211f4-f785-ea11-aa77-501ac539d1ea&excludeUnderlyingTaxons=true&includeAllTypes=true&hasMedia=false&includeDescendantTaxons=true&includeSpeciesGroupFacet=true&includeOrphanRecords=false&sortBy=1&tabMode=Reg>
- Baagøe, H. J., & Jensen, T. S. (2007). *Dansk Pattedyr Atlas*. Gyldendal.
- COWI. (2001). *The great Belt Link. The monitoring programme 1987-2000*. COWI and DHI Joint Venture: Sund & Bælt.
- COWI. (2008). *Natura 2000 vurdering af klapplass ved Gåseholm - Teknisk Baggrundsrapport*. Lyngby: COWI.
- COWI. (2023). *Vurdering af virkninger ved miljøet i forbindelse med uddybning af Grådyb*. Miljøkonsekvensrapport for Esbjerg Havn.
- COWI. (2024). *ANSØGNING OM YDERLIGERE UDDYBNING I THYBORØN KANAL*. COWI.
- DCE. (2014). *Baggrunds niveau for barium, zink, kobber, nikkel og vanadium i fersk- og havvand. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi*.
- DCE. (2024). *Marine områder - NOVANA. Videnskabelig rapport fra DCE*. Aarhus Universitet. DCE - National Center for Miljø og Energi .
- DHI. (2009). *Thyborøn Havn Undersøgelser af bølge- og sedimentforhold*. Thyborøn Havn.
- DHI. (Januar 2018). *Marine Vegetation Atlas*. Hentet fra <https://marine-vegetation.satlas.dk/>.
- DMI. (Januar 2024). *Strømprognoze for de næste 48 timer*. Hentet fra <https://www.dmi.dk/strom>.
- DOF. (April 2024). *DOF Agger Tange*. Hentet fra <https://www.dof.dk/oplev-fuglene/fuglesteder/jylland/agger-tange>.
- DOF. (April 2024). *DOF Harboøre Tange*. Hentet fra <https://www.dof.dk/oplev-fuglene/fuglesteder/jylland/agger-tange>.
- Energistyrelsen. (2023). *Guideline for underwater noise. Installation of impact or vibratory driven piles*. Energistyrelsen .
- Erfteimeijer, P. L., & Lewis, R. (2006). Environmental impacts of dredging on seagrasses: A review. *Marine pollution bulletin*, 52, 1553-1572.
- Foden, J., Rogers, S., & Jones, A. (2011). Human pressures on UK seabed habitats: A cumulative impact assessment. *Marine Ecology Progress Series*, 428, 33-47.

- Gilles et al. (2023). *Estimates of cetacean abundance in European Atlantic waters in summer 2022 from the SCANS-IV aerial and shipboard surveys.*
- Gilles, A., et al. (2023). *Estimates of Cetacean abundance in European Atlantic waters in summer 2022 from the SCANS-IV aerial and Shipboard surveys.*
- Goudie, R., & Jones, I. (2004). Dose-response relationships of harlequin duck behaviour to noise from low-level military jet over-flights in central Labrador. *Environmental Conservation* 31 (4):, s. 289-298.
- Hirvonen, H. (2001). Impacts of highway construction and traffic on a wetland bird community. In: Proceedings of the 2001 International Conference on Ecology and Transportation. Eds. Irwin CL, Garrett P, McDermott KP, Center for Transportation and the Envi.
- Håkansson.L., E. J. (2010). "Relationship between Chlorophyll, Salinity, Phosphorous, and Nitrogen in Lakes and Marine Areas", *Journal of Coastal Research*. 26, 3, pp412-423, West Palm Beach, Florida. May 2010. .
- Jakob Tougaard, S. S. (2021). *Marine mammal species of relevance for assessment of impulsive noise sources in Danish waters.* DCE.
- Jens Würdler Hansen & David Rytter. (2024). *Iltsvind i danske farvande 29. august-25. september 2024.* DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi.
- Keller, O. L., & R, K. (2006). *Litterature Review of Offshore Wind Farms with Regard to Fish Fauna.* Zucco C, Wende W, Merck T, Köchling I, Köppel J (eds) Ecological Research on Offshore Wind Farms: International Exchange of Experience.
- Kinze, C. (2.. december 2022). *Den Store Danske.* Hentet fra vågehval i Den Store Danske på lex.dk. :
<https://denstoredanske.lex.dk/v%C3%A5gehval>
- Kinze, C. C. (oktober 2024). *Naturen i Danmark* . Hentet fra Øresvin:
<https://naturenidanmark.lex.dk/%C3%98resvin>
- Kjørboe, & Møhlenberg. (1982). *Sletter havet sporene? En biologisk undersøgelse af miljøpåvirkninger ved ral- og sandsugning.* Miljøministeriet, Fredningsstyrelsen.
- Krog, C., & Carl, H. (2019). Stavsild. I H. Carl, & M. P. M, *Atlas over danske saltvandsfisk.* Statens Naturhistoriske Museum.
- Kyhn et al. (2021a). Geofysiske og geotekniske forundersøgelser til Energiø Nordsø. Vurdering af påvirkning på havpattedyr. *Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 433.*
- København og Malmø Kommune. (2015). *Resultater af fase 2 miljøfrågor.* Øresundsmetro København Malmø.
- Miljø og Fødevareministeriet. (2019). *Danmarks Havstrategi II. Første del. God Miljøtilstand. Basisanalyse. Miljømålt.*
- MiljøGIS. (november 2024). Hentet fra
<https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3hoering2021>
- MiljøGIS. (oktober 2024). *MiljøGIS.* Hentet fra
<https://miljoegis.mim.dk/spatialmap>.
- Miljøministeriet. (2023). *Danmarks Havstrategi II. Tredje del. Indsatsprogram.* . Miljøministeriet .
- Miljøministeriet. (2023). *Vandområdeplanerne 2021-2027. Miljøministeriet.*
- Miljøministeriet. (2023a). *Vandområdeplanerne 2021-2027. Miljøministeriet.*


- Miljøstyrelsen. (2021). *Natura 2000-basisanalyse 2022-2027 (revideret) Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø*. Miljøstyrelsen.
- Miljøstyrelsen. (2023). *Natura 2000-plan 2022-2027 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø*. Miljøstyrelsen.
- Miljøstyrelsen. (2024). *Nakskov Havn. Klaptilladelse til uddybningsmateriale fra sejltrede. J.nr. 2020-18267. Den 8. marts 2024*.
- Nationalpark Thy. (2019). Hentet fra <https://nationalparkthy.dk/oplevel-nationalparken/high5-intro/spaettet-sael-big/>.
- Naturbasen. (2022). Hentet fra <https://www.naturbasen.dk/art/956/vaagehval>
- NIRAS. (2015). *Vesterhav Syd Havmøllepark*. Energinet: VVM redegørelse, Baggrundsrapport.
- Petersen, T. (2017). *Sedimentation around Thyborøn Channel*. Aalborg University, Student report.
- Powilleit, M., Kleine, J., & Leuchs, H. (2006). Impacts of experimental dredged material disposal on a shallow, sublittoral macrofauna community in Mecklenburg Bay (Eastern Baltic Sea). *Marine Pollution Bulletin*, 52, 386-396.
- Rambøll. (2004). *Thyborøn Havn VVM for udbygning af Thyborøn Havn*.
- Rambøll. (2020). *Bilagsrapport - Miljøkonsekvensrapport Kystbeskyttelse Lodbjerg - Nymindegab*. Virum: Kystdirektoratet, Kystbeskyttelse - Drift og anlæg.
- Rambøll. (2020). *Miljøkonsekvensrapport - Kystbeskyttelse Lodbjerg Nymindegab Hovedrapport, udarbejdet for Kystdirektoratet*.
- Reine, K. J., Clarke, D. G., & Dickerson, C. (2012). *Characterization of underwater sounds produced by a backhoe dredge excavating rock and gravel*. Environmental Laboratory US (ERDC TN-DOER ; E36).
- Richardson, W. J., & Greene, C. R. (1995). *Marine Mammals and Noise*. London: Academic Press.
- Robinson, S. P., Theobald, P. D., Hayman, G., Wang, L. S., Lepper, P. A., Humphrey, V., & Mumford, S. (2011). *Measurements of underwater noise arising from marine aggregate dredging operations*. MALSF Report MEPF 09 / PI08.
- Sveegaard, S., Nabe-Nielsen, J. & Teilmann, J. (2018). *Marsvins udbredelse og status for*. Aarhus Universitet, DCE.
- Ward, D., & Stehn, R. (1989). *Response of brant and other geese to aircraft disturbances at Izembek Lagoon, Alaska (Final rept MMS-90/0046)*. Minerals Management Service Anchorage, AK. Alaska Outer Continental Shelf Office. In Effects of military no.

Appendix A Vandområdeplanerne

Projekt om uddybning af delområde S6 overlapper med vandområde 232 Nisum Bredning (Figur A-1). Der kan potentielt ske en spredning af sediment til det tilstødende vandområde 133 Vesterhavet, nord. Følgende vandområder er dermed medtaget i nærværende vurdering jf. Vandområdeplanerne:

- > 232 Nisum Bredning
- > 133 Vesterhavet, nord

Vandområdet er omfattet af vandområdeplanen for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn 2021-2027 (Miljøministeriet, 2023).



Figur A-1 Oversigt over projektområde, delområde S6 hvor der uddybes samt vandområderne 232 Nisum Bredning og 133 Vesterhavet, nord.

A.1 Lovgrundlag

A.1.1 Vandrammedirektivet og lov om vandplanlægning

EU's vandrammedirektiv⁵ fastlægger rammerne for beskyttelsen af overfladevand (vandløb, søer, overgangsvande og kystvande) og grundvand i alle EU-medlemslande. Direktivet fastsætter bl.a. at medlemsstaterne skal forebygge forringelse af tilstanden for alle målsatte overfladevandområder og grundvandsforekomster og beskytte, forbedre og restaurere alle overfladevandområder og grundvandsforekomster med henblik på at opnå god økologisk og god kemisk tilstand for overfladevandområder og god kemisk og kvantitativ tilstand for grundvandsforekomster senest 2015⁶.

Vandrammedirektivet er – fra anden vandplanlægningsperiode og frem – gennemført i lov om vandplanlægning⁷ med tilhørende bekendtgørelser. Vandplanlægningsloven fastlægger rammerne for beskyttelsen af overfladevand og grundvand. Loven forpligter miljøministeren til at fastsætte miljømål, iværksætte indsatsprogrammer, overvåge og udarbejde vandområdeplaner med henblik på at forebygge forringelse af og opnå god tilstand i overfladevandområder og grundvandsforekomster i overensstemmelse med vandrammedirektivet.

I medfør af vandplanlægningsloven er gennemført en statslig vandplanlægning, som består i statslige vandområdeplaner for hvert vandområdedistrikt, og som alene er af orienterende karakter. Danmark er inddelt i fire vandområdedistrikter: I) Vandområdedistrikt Jylland og Fyn, II) Vandområdedistrikt Sjælland, III) Vandområdedistrikt Bornholm og IV) Internationalt vandområdedistrikt⁸.

Vandområdeplaner for 3. planperiode – 2021-2027 blev offentliggjort den 15. juni 2023. Samtidig er en række bekendtgørelser opdateret⁹.

A.1.2 Miljømål og indsatser

Miljømålet for hovedparten af vandområder er at opnå god tilstand i alle vandområder senest 2027¹⁰. Miljømål for de afgrænsede vandforekomster i de 4 vandområdedistrikter i Danmark er fastsat i bekendtgørelse om miljømål for

⁵ Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger

⁶ Den fastsatte frist i vandrammedirektivet er 2015. Direktivet rummer imidlertid mulighed for at forlænge fristen for målopfyldelse, jf. artikel 4, stk. 4. Miljømålet i de seneste vandområdeplaner er for hovedparten af danske vandområder at opnå god tilstand i alle vandområder senest 2027

⁷ Vandplanlægningsloven, bekendtgørelse nr. 126 af 26. januar 2017 af lov om vandplanlægning.

⁸ Bekendtgørelse nr. 793 af 13. juni 2023 om vandområdedistrikter og hovedvandoplande

⁹ vandomraadeplanerne-2021-2027-5-7-2023.pdf (mim.dk)

¹⁰ Den oprindeligt fastsatte frist i vandrammedirektivet er 2015. Direktivet rummer imidlertid mulighed for at forlænge fristen for målopfyldelse indtil 2027, jf. artikel 4, stk. 4

overfladevandområder og grundvandsforekomster¹¹. Der er fastsat miljømål for økologisk og kemisk tilstand for kystvande ud til 1 sømil fra basislinjen. Der er derudover for de såkaldte territoriale farvande – fra 1 sømil til 12 sømil fra basislinjen – fastsat mål for kemisk tilstand.

God tilstand for overfladevand er, når både økologisk tilstand og kemisk tilstand er god. For grundvand er miljømålet opnået, når den kvantitative tilstand og den kemiske tilstand er god.

A.1.3 Fastlæggelsen af vandområdernes tilstand

Den økologiske tilstand for overfladevand - herunder kystvande - beskrives ved brug af 5 tilstandsklasser (henholdsvis høj, god, moderat, ringe eller dårlig tilstand).

A.1.4 Indsatsbekendtgørelsen og begrebet "forringelse"

I medfør af vandplanlægningsloven er bl.a. udstedt bekendtgørelse om indsatsprogrammer¹², som fastlægger de nødvendige indsatser for at nå miljømålene. Bekendtgørelsen indeholder i § 8 en pligt for myndigheder til ikke at træffe afgørelser, hvis afgørelsen kan medføre forringelse af målsatte overfladevandområder eller hindre opfyldelse af miljømål. Det følger heraf, at det skal sikres, at afgørelser ikke vil medføre forringelse af tilstanden i målsatte vandforekomster eller hindre opfyldelse af de konkret fastsatte mål.

Vandrammedirektivet indeholder ikke en definition på, hvornår der foreligger en forringelse af tilstanden af et vandområde. EU-Domstolen har imidlertid i den principielle Weser-dom¹³ fastslået, at der foreligger en forringelse af den økologiske tilstand af et overfladevandområde (f.eks. et kystvandområde), når mindst et af kvalitetselementerne (dvs. for kystvande ålegræs, klorofyl eller bundfauna) falder en tilstandsklasse (et niveau – f.eks. fra god til moderat tilstand), selv om det ikke fører til, at hele vandområdet rykker en klasse ned. Hvis vandområdet allerede befinder sig i den laveste klasse (dårlig tilstand) for et kvalitetselement, vil enhver yderligere forringelse af et kvalitetselement udgøre en forringelse i direktivets forstand.

EU-Domstolen har i efterfølgende afgørelser slået fast, at Weser-dommens retningslinjer for, hvornår der foreligger en forringelse, gælder for såvel grundvand som overfladevand og for både den økologiske og den kemiske tilstand samt for midlertidige påvirkninger¹⁴.

¹¹ Bekendtgørelse nr. 819 af 15. juni 2023 om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster

¹² Bekendtgørelse nr. 797 af 13. juni 2023 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (Indsatsbekendtgørelsen)

¹³ C-461/13, præmis 69-70

¹⁴ Se bl.a. sag C-535/18, Land Nordrhein-Westfalen og sag C-535/18, Detmold samt C-525/20, Association France Nature Environment

Ud over forbuddet mod forringelse, må en afgørelse heller ikke hindre opfyldelse af det fastlagte miljømål, herunder gennem de i indsatsprogrammet fastlagte foranstaltninger. Disse foranstaltninger omfatter bl.a. kvælstofreduktionskrav for kystvande. Disse supplerende foranstaltninger er fastsat i indsatsbekendtgørelsens bilag 1-4.

I vurderingen af, om der kan træffes afgørelse, inddrages omfanget af påvirkning i forhold til den samlede påvirkning af overfladevandområdet også fra andre kilder. Det vil sige, at der gælder en forpligtelse til at inddrage en vurdering af kumulative effekter fra andre planer eller projekter i vurderingen efter indsatsbekendtgørelsens § 8, stk. 5.

I de tilfælde, hvor der for en plan eller et projekt ikke kan udelukkes en forringelse af en vandforekomst eller, at planen eller projektet er til hinder for, at fastsatte miljømål kan opfyldes, findes begrænsede og restriktive fravigelsesmuligheder.

Indsatsbekendtgørelsens § 8, stk. 4 indeholder en mulighed for, at myndigheden, hvor denne vurderer, at der ikke kan meddeles tilladelse til udledning af kvælstof eller fosfor i overensstemmelse med forringelsesforbuddet og kravet om ikke at hindre målopfyldelse, kan indbringe sagen for Miljøstyrelsen, der i særlige tilfælde og efter en konkret vurdering vil kunne tillade, at myndigheden meddeler tilladelse.

Derudover gælder generelt i f.t. påvirkninger, at hvis forringelse af målsatte vandforekomster eller hindring af målopfyldelse ikke kan udgås, findes en snæver adgang til at fravige de fastlagte miljømål i miljømålsbekendtgørelsens § 4.

A.1.5 Vurdering af påvirkninger

Vurderingen af påvirkninger på et vandområde tager udgangspunkt i den eksisterende tilstand i vandområdet. For de kystnære farvande udgøres de biologiske kvalitetselementer af fytoplankton, bunddyr og rodfæstede bundplanter. Hertil kommer såkaldte understøttende kvalitetselementer som f.eks. iltforhold og vandets klarhed.

Den økologiske tilstand for målsatte vandområder opgøres både samlet og for hvert kvalitetselement i en af 5 tilstandsklasser: Høj tilstand, god tilstand, moderat tilstand, ringe tilstand og dårlig tilstand. I vurderingen af den økologiske tilstand for vandløb og kystvande indgår også visse nationalt specifikke stoffer som et kvalitetselement. For dette kvalitetselement opereres alene med tilstandsklasserne god og ikke god tilstand.

Den samlede økologiske tilstand for et vandområde svarer til den lavest bedømte tilstand blandt de kvalitetselementer, det har været muligt at anvende i det enkelte vandområde, jf. Weser-dommen. Tilstanden for kvalitetselementer og den samlede økologiske tilstand opdateres hvert 6. år i MiljøGIS.

Kemisk tilstand vurderes ud fra koncentrationen af 45 stoffer i vandfasen, biota (levende organismer) og sediment, som EU har prioriteret, og som udgør en særlig risiko for vandmiljøet. Miljøkvalitetskravene, der ligger til grund for vurdering af hhv. økologisk og kemisk tilstand for miljøfarlige forurenende stoffer, fremgår af bilagene til bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand¹⁵.

A.1.6 Metode

I de følgende afsnit er foretaget en vurdering af projektets nuværende kendte påvirkninger på en række vandforekomster, som med udgangspunkt i de nuværende beskrivelser af projektets rammer forudsættes at kunne blive påvirket. Vurderingerne er foretaget med udgangspunkt i de krav til vurderinger, som er fastlagt i indsatsbekendtgørelsen § 8 og nærmere defineret i praksis fra EU-Domstolen og de danske klagenævn i f.t. f.eks. fastlæggelse af, hvornår der foreligger en forringelse. Vurderingen foretages ud fra nuværende kendte oplysninger om projektets karakter og mulige påvirkninger.

Appendix A indeholder vurderingen af projektets påvirkning på målsatte vandforekomster. Afsnittet omhandler påvirkninger på kystvande indenfor 1-sømlsgrænsen.

Kilder anvendt til beskrivelse af eksisterende tilstand samt vurderinger:

- > MiljøGIS
- > Tredje generation af vandområdeplaner gældende for 2021-2027
- > Vandplandata.dk
- > BEK nr. 797 af 13/06/2023 Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (Indsatsbekendtgørelsen)
- > NOVANA-rapporter
- > Videnskabelige referencer som refereret i teksten
- > Ansøgning om yderligere uddybning i Thyborøn Kanal (COWI, 2024)

A.2 Potentielle påvirkninger

De potentielle påvirkninger beskrives for at skabe overblik over, hvilke påvirkninger, der kan forekomme ved uddybningen og udvidelse af Sælhundeholm Løb. Disse potentielle påvirkninger bliver herefter vurderet for at undersøge om de vil tilstandsforringe kvalitetselementerne jf. Vandområdeplanerne 2021-2027.

Aktiviteten, der kan påvirke vandområdenes tilstand, er uddybning af sediment i delområdet S6 i Sælhundeholm Løb med en mængde på 142.000 m³. Delområdet S6 skal uddybes fra -11,3 m DVR90 til -12,05 m DVR90 og i bredden fra 95 m til 110 m. Endvidere tillægges yderligere 10.000 m³ om året for oprensningen i delområdet S6 (COWI, 2024). En oversigt over disse aktiviteter og potentielle påvirkninger i anlægs- og driftsfase på den økologiske og kemiske tilstand for

¹⁵ Bekendtgørelse nr. 796 af 13. juni 2023

vandområde 232 Nisum Bredning samt vandområde 133 Vesterhavet, nord præsenteres i Tabel A-1.

Tabel A-1 Oversigt over aktiviteter der potentielt kan påvirke den økologiske og kemiske tilstand for vandområde 232 Nisum Bredning og 133 Vesterhavet, nord.

Påvirkning	232 Nisum Bredning	133 Vesterhavet
Aktivitet	Uddybning og oprensning af delområdet S6 i Sælhundeholm Løb	Spredning af uddybnings- og oprensningsmateriale fra delområdet S6
Påvirkning økologisk tilstand	> Ophvirvling af sediment, spild og efterfølgende sedimentation > Frigivelse af næringsstoffer > Frigivelse af miljøfarlige forurenende stoffer (nationalt specifikke stoffer) > Direkte fysisk påvirkning af havbunden.	> Spredning af sediment, spild og efterfølgende sedimentation > Spredning af næringsstoffer > Spredning af miljøfarlige forurenende stoffer (nationalt specifikke stoffer)
Vurdering økologisk tilstand	> Ålegræs > Fytoplankton > Bundfauna > Nationalt specifikke stoffer > Iltforhold > Lysforhold	> Ålegræs > Fytoplankton > Bundfauna > Nationalt specifikke stoffer > Iltforhold > Lysforhold
Påvirkning kemisk tilstand	> Frigivelse af miljøfarlige forurenende stoffer (EU prioriterede stoffer)	> Spredning af miljøfarlige forurenende stoffer (EU prioriterede stoffer)
Vurdering kemisk tilstand	> Miljøkvalitetskrav for EU prioriterede stoffer	> Miljøkvalitetskrav for EU prioriterede stoffer

En oversigt over aktiviteter og potentielle påvirkninger på de enkelte kvalitets-elementer for vandområde 232 Nisum Bredning vandområde 133 Vesterhavet, nord præsenteres i Tabel A-2.

Tabel A-2 Oversigt over aktiviteter, der potentielt kan påvirke den økologiske og kemiske tilstand for vandområde 232 Nisum Bredning vandområde 133 Vesterhavet, nord. Anlægsfase er uddybningen (142.000 m³) og driftsfase er oprensningen (10.000 m³).

Kvalitets-element	Miljø-mål	Tilstand 232 Nisum bredning	Tilstand 133 Vesterhavet, nord	Potentiel påvirkning af tilstand (anlægsfase og driftsfase)
Samlet økologisk tilstand	God økologisk tilstand	Ringe økologisk tilstand	Moderat økologisk tilstand	Påvirkning på de økologiske kvalitets-elementer.
Fytoplankton (klorofyl)	God økologisk	Ringe økologisk tilstand	Moderat økologisk tilstand	Ved uddybning og oprensning af delområdet S6 af sejlrinden vil der potentielt frigives næringsstoffer

Kvalitets- element	Miljø- mål	Tilstand 232 Nis- sum bredning	Tilstand 133 Ve- sterhavet, nord	Potentiel påvirk- ning af tilstand (anlægsfase og driftsfase)
	til- stand			fra sedimentet, hvil- ket kan give anled- ning til algeopblom- string og dermed på- virke fytoplankton- indholdet i vandet.
Rodfæ- stede bundplan- ter	God økolo- gisk til- stand	Ringe økologisk til- stand	Data ikke anvende- lige	Ved uddybning og oprensning af delom- råde S6 af sejlrenden vil der potentielt fri- gives næringsstoffer fra sedimentet, hvil- ket kan give anled- ning til algeopblom- string, øget iltforbrug og dermed påvirke rodfæstede bund- planter. Endvidere kan der med spredning af se- dimentfaner fore- komme skygning af bundvegetation.
Bunddyr (bentiske inverte- brater)	God økolo- gisk til- stand	Moderat økologisk tilstand	God økologisk til- stand	Ved uddybning og oprensning af delom- råde S6 af sejlrenden vil der være et habi- tattab af bundfauna i området.
Nationalt specifikke stoffer	God økolo- gisk til- stand	Ikke-god økologisk tilstand (methylnaphtalene)	God økologisk til- stand	Ved uddybning og oprensning af delom- råde S6 af sejlrenden vil der potentielt fri- gives miljøfarlige for- urenende stoffer til vandsøjlen.
Iltforhold	God økolo- gisk til- stand	Data ikke anvende- lige	Data ikke anvende- lige	Ved uddybning og oprensning af delom- råde S6 af sejlrenden vil der potentielt fri- gives næringsstoffer, hvilket kan give an- ledning til algeop- blomstring og der- med øget iltforbrug.
Vandets klarhed (lys, gen- nemsig- tigheds- forhold)	God økolo- gisk til- stand	Data ikke anvende- lige	Data ikke anvende- lige	Ved uddybning og oprensning af delom- råde S6 af sediment vil der potentielt fri- gives næringsstoffer, hvilket kan give an- ledning til algeop- blomstring og der- med forringet forhold

Kvalitets- element	Miljø- mål	Tilstand 232 Nis- sum bredning	Tilstand 133 Ve- sterhavet, nord	Potentiel påvirk- ning af tilstand (anlægsfase og driftsfase)
				for lysnedtrængning til bundvegetationen.
Samlet kemisk tilstand	God ke- misk til- stand	Ikke-god kemisk til- stand	Ikke-god kemisk til- stand	Overskridelse af mil- jøkvalitetskrav (MKK) af de EU- prioriterede stoffer ved uddybning og oprensning af delom- råde S6 af sejlren- den.
Kemisk tilstand	God ke- misk til- stand	Ikke-god kemisk til- stand (bly)	Ikke-god kemisk til- stand (BDE, octylphenoler og kviksølv)	Ved uddybning og oprensning af delom- råde S6 af sediment vil der potentielt fri- gives miljøfarlige for- urenende stoffer til vandsøjlen. For vandområde 232 er tale om overskridelse af bly. For vandom- råde 133 er der tale om BDE, octylpheno- ler og kviksølv.

A.3 Eksisterende forhold i projektområdet

I dette kapitel beskrives den eksisterende miljøtilstand i de danske vandområder, primært baseret på data fra de nationale overvågningsprogrammer for miljøtilstanden (NOVANA), vandområdeplaner samt videnskabelige artikler.

A.3.1 232 Nisum Bredning

Delområdet S6 i sejlrenden overlapper med 1 sømil-vandområdet 232 Nisum Bredning, og kan potentielt påvirkes ved uddybning og oprensning i delområde S6 af sediment indenfor vandområdet.

Vandområdet, tilhørende vandområdedistrikt Jylland og Fyn, karakteriseres som fjord med overfladesalinitet. Arealet af kystvandområdet er 238,16 km².

Miljømålet for den samlede økologiske tilstand er "god økologisk tilstand" og miljømålet for den kemiske tilstand er "god kemisk tilstand".

Ifølge basisanalysen for vandområdeplan 2021-2027 er den samlede økologiske tilstand i 232 Nisum Bredning i "ringe økologisk tilstand", mens den kemiske tilstand er "ikke-god", se Tabel A-3.

Tabel A-3 Økologisk og kemisk tilstand for 232 Nisum Bredning vurderet i basisanalysen for vandområdeplan 2021-2027 (MiljøGIS, 2024).

Kvalitetselement	Tilstand
Biologiske kvalitetselementer:	
Fytoplankton (klorofyl)	Ringe økologisk tilstand
Rodfæstede bundplanter (eks. ålegræs og vandaks)	Ringe økologisk tilstand
Bunddyr (bentiske invertebrater)	Moderat økologisk tilstand
Fysisk-kemiske kvalitetselementer:	
Iltforhold	Ikke anvendelig
Vandets klarhed (lys – gennemsigtighedsforhold)	Ikke anvendelig
Nationalt specifikke stoffer	Ikke-god økologisk tilstand*
Samlet økologisk tilstand	Ringe økologisk tilstand
Miljømål økologisk tilstand	God økologisk tilstand
Kemisk tilstand (EU prioriterede stoffer)	Ikke-god kemisk tilstand (bly)
Miljømål kemisk tilstand	God kemisk tilstand

*Den ikke-gode økologiske tilstand for nationalt specifikke stoffer er baseret på én måling i 2011, hvor summen af methylnaphthalener er målt i sediment og overskrider miljøkvalitetskravet. Der er ikke målt andre nationalt specifikke stoffer i vandområdet.

A.3.2 133 Vesterhavet, nord

Delområdet S6 i sejlrenden overlapper ikke med 1 sømil-vandområdet 133 Vesterhavet, nord, men der kan potentielt forekomme sedimentspredning fra uddybning og oprensning i delområdet S6 og ind i vandområde 133 Vesterhavet, nord og dermed påvirke vandområdets kvalitetselementer og målopfyldelsen.

Vandområdet, tilhørende vandområdedistrikt Jylland og Fyn, karakteriseres med en typologi med gennemsnitsdybde, overfladesalinitet og tidevand. Arealet af kystvandområdet er 214,57 km².

Miljømålet for den samlede økologiske tilstand er "god økologisk tilstand" og miljømålet for den kemiske tilstand er "god kemisk tilstand".

Ifølge basisanalysen for vandområdeplan 2021-2027 er den samlede økologiske tilstand i 133 Vesterhavet, nord i "moderat økologisk tilstand", mens den kemiske tilstand er "ikke-god", se Tabel A-4.

Tabel A-4 Økologisk og kemisk tilstand for 133 Vesterhavet, nord vurderet i basisanalysen for vandområdeplan 2021-2027 (MiljøGIS).

Kvalitetselement	Tilstand
Biologiske kvalitetselementer:	
Fytoplankton (klorofyl)	Moderat økologisk tilstand
Rodfæstede bundplanter (eks. ålegræs og vandaks)	Ikke anvendelig
Bunddyr (bentiske invertebrater)	God økologisk tilstand

Kvalitetsэлемент	Tilstand
Fysisk-kemiske kvalitetsэлементer:	
Iltforhold	Ikke anvendelig
Vandets klarhed (lys – gennemsigtighedsforhold)	Ikke anvendelig
Nationalt specifikke stoffer	God økologisk tilstand*
Samlet økologisk tilstand	Moderat økologisk tilstand
Miljømål økologisk tilstand	God økologisk tilstand
Kemisk tilstand (EU prioriterede stoffer)	Ikke-god kemisk tilstand (BDE, octylphenoler og kviksølv)
Miljømål kemisk tilstand	God kemisk tilstand


*Den gode økologiske tilstand for nationalt specifikke stoffer er baseret på én enkelt måling i 2019, hvor summen af methylnaphthalener er målt til at være under miljøkvalitetskravet. Der er ikke målt andre nationalt specifikke stoffer i vandområdet.

A.3.3 NOVANA – Det Nationale Overvågningsprogram

Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA) overvåger vandmiljøets og naturens tilstand inden for de områder, der prioriteres i forhold til de politisk fastsatte økonomiske rammer.

Miljøstyrelsens overvågning af hav og fjorde dokumenterer tilstanden i kystvandområderne. Hermed er det muligt at vurdere, hvordan tilstanden har udviklet sig over årene, og om det marine miljø lever op til nationale og internationale målsætninger. Samtidig udgør overvågningen grundlaget for, at der kan beregnes den indsats, der skal til for at opfylde målsætningerne i vandområdeplanerne 2021-2027.

Lige syd for Agger Tange findes der en målestation, som både indsamler data omkring bestanden af spættet sæl (stationsnummer SSÆL25) samt ungeoptælinger af spættet sæl (stationsnummer Fjordholmene). Længere oppe i Krik Vig ligger en målestation, hvor der undersøges for habitatnaturtyper (stationsnummer Krik Vig), som fauna på sandbund og blød bund. Ca. 3 km syd for projektområdet (MiljøGIS, 2024) findes der en målestation, som både indsamler data omkring bestanden af spættet sæl (stationsnummer SSÆL26) samt ungeoptælinger af spættet sæl (stationsnummer Rønland Sandø). Målestationerne ses i nedenstående Figur A-2.



Figur A-2 Oversigt over relevante NOVANA-overvågningsstationer (nordligste station: SSÆL25 og Fjordholmene; sydligste station: SSÆL26 og Rønland Sandø) samt delområdet S6.

A.3.4 Væsentlige nuværende påvirkninger

De to vandområder (232 Nissum Bredning og 133 Vesterhavet, nord) har ikke god kemisk tilstand og miljømålene for kemisk tilstand er dermed ikke opnået. Endvidere er der samlet ringe økologisk tilstand i vandområde 232 Nissum Bredning, dette er baseret på den ringe tilstand for kvalitetselementerne fytoplankton og rodfæstede bundplanter. For det øvrige biologiske kvalitetselement, bunddyr, er der moderat økologisk tilstand.


For vandområde 133 Vesterhavet, nord, som ikke overlapper med delområde S6, er der samlet moderat økologisk tilstand, dette er baseret på den moderate tilstand for kvalitetselementet fytoplankton. For de to øvrige biologiske kvalitetselementer, bunddyr og rodfæstede bundplanter, er der hhv. god økologisk tilstand og ikke anvendelige data.

Tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer fra punktkilder til vandmiljøet sker især gennem udledning af spildevand fra virksomheder, landbrugsarealer,

renseanlæg, regnbetingede udledninger, spredt bebyggelse, ferskvandsdambrug, saltvandsdambrug og havbrug. Anden tilførsel sker ved klapning af havnesediment og andet forurenet havbundsmateriale.

Lavt iltindhold (4-6 mg/l) stresser larvestadiet af nogle bunddyr og fisk samt voksne individer af særligt følsomme arter. Hvis iltforholdene forværres, f.eks. ved tilførsel af kvælstof, kan der opstå moderat iltsvind (2-4 mg/l), hvor fisk og mobile bunddyr vil søge væk fra de ramte områder. Ved længere perioder med kraftigt iltsvind (<2 mg/l) dør bunddyr og bundplanter. Selv fisk og mobile bunddyr kan blive udsat for iltsvind, hvis vind og strøm pludselig flytter iltfattigt vand fra et område til et andet.

Der er ikke registreret iltsvind eller lavt iltindhold i 2024 i hovedstrømretningen fra Thyborøn og ind i Nissum Bredning, se Figur A-3 (Jens Würgler Hansen & David Rytter, 2024).



Figur A-3 Modelleret arealudbredelse af iltsvind i Limfjorden, Mariager Fjord og Randers Fjord baseret på målinger fra 17.-25. september 2024 (Jens Würgler Hansen & David Rytter, 2024).

A.3.5 Indsatsbehov for næringsstoffer

Kvælstof er en essentiel parameter i vandområdeplanerne, da forøgede mængder af næringsstoffet medfører forringelse af biologien i havvand. For at opfylde miljømålene for kystvande er der indført frivillige indsatser til reduktion af kvælstoftilførsel til vandområderne.

Det fremgår af Indsatsbekendtgørelsens¹⁶ § 8, stk. 4, at Miljøstyrelsen kun i særlige tilfælde og efter en konkret vurdering kan tillade yderligere udledning af kvælstof eller fosfor.

Det fremgår af indsatsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit 3 om kystvande, at der potentielt kan være en omtrentlig reduktion af kvælstoftilførsel fra oplande til kystvande gennem etablering af vådområder og gennemførelse af lavbundsprojekter planlagt for 3. planperiode 2021-2027.

For vandområde 232 Nisum Bredning er følgende indsatser planlagt:

- > Etablering af vådområder: 7,5 tons N/år (Miljøministeriet, 2023)
- > Gennemførelse af lavbundsprojekter: 1,6 tons N/år (Miljøministeriet, 2023)

For vandområde 232 Nisum Bredning, er der en baselinebelastning på 745 tons N/år, en målbelastning på 536,1 tons N/år og dermed et indsatsbehov på 209 tons N/år (Miljøministeriet, 2023). Der kan således ikke udledes mere kvælstof til vandområdet, da det kan være til hinder for målopfyldelsen.

For vandområde 133 Vesterhavet, nord er der en baselinebelastning på 6.482 tons N/år og en målbelastning på 7.237 tons N/år (Miljøministeriet, 2023). Der er således ikke et indsatsbehov for kvælstof i vandområdet.

Indsatsbekendtgørelsens § 8, stk. 4 indeholder en mulighed for, at myndigheden, hvor denne vurderer, at der ikke kan meddeles tilladelse til udledning af kvælstof eller fosfor i overensstemmelse med forringelsesforbuddet og kravet om ikke at hindre målopfyldelse, kan indbringe sagen for Miljøstyrelsen, der i særlige tilfælde og efter en konkret vurdering vil kunne tillade, at myndigheden meddeler tilladelse.

Derudover gælder generelt i f.t. påvirkninger, at hvis forringelse af målsatte vandforekomster eller hindring af målopfyldelse ikke kan udgås, findes en snæver adgang til at fravige de fastlagte miljømål i miljømålsbekendtgørelsens § 4.

A.3.6 Opsummering

Miljømålene for vandområdet 232 Nisum Bredning er, at der skal være god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Målsætningerne er ikke opfyldt for vandområdet. Der er fastsat et indsatsbehov for kvælstof i vandområde 232 på 209 tons N/år. Der kan således ikke udledes mere kvælstof til vandområdet, da det kan være til hinder for målopfyldelsen.

Miljømålene for vandområdet 133 Vesterhavet, nord er, at der skal være god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Målsætningerne er ikke opfyldt for

¹⁶ 797 af 13/06/2023

vandområdet. Der er ikke et indsatsbehov for kvælstof i vandområde 133 jævnfør indsatsbekendtgørelsen.

A.4 Vurdering af vandområder

Vurdering tager udgangspunkt i både anlægs- og driftsfasen, eftersom der er tale om samme aktivitet med uddybning i sejlrenden samt efterfølgende oprensning, når der er behov for det. Der gøres opmærksom på, at uddybningsmængden er 142.000 m³ samt at oprensningsmængden er 10.000 m³ i delområde S6 (COWI, 2024).

A.4.1 Kystvandområder – generelt

Vurderingen af potentielle påvirkninger på målsatte vandområder foretages på baggrund af de definerede kvalitetselementer, samt de understøttende kemiske og fysisk-kemiske elementer. For den økologiske tilstand foretages indledningsvist en identifikation af de relevante kvalitetselementer, blandt andet på baggrund af de forventede potentielle påvirkninger (Tabel A-2):

- > Rodfæstede bundplanter: Kvalitetselementet består samlet af makroalger samt rodfæstede planter som ålegræs og vandaks. For en vurdering af tilstanden for de rodfæstede planter anvendes dybdegrænsen for hovedudbredelsen af de rodfæstede planter, svarende til 10% dækning af havbunden. Kvalitetselementet kan potentielt påvirkes ved fysisk påvirkning, ophvirvling af sediment samt frigivelse af næringsstoffer og vurderes relevant for uddybning og oprensning af sedimentmateriale.
- > Fytoplankton/klorofyl: For en vurdering af tilstanden for fytoplankton anvendes koncentrationen af klorofyl a som mål for algebiomassen. Kvalitetselementet kan potentielt påvirkes ved frigivelse af næringsstoffer og vurderes relevant for uddybning og oprensning af sedimentmateriale.
- > Bentiske invertebrater/bunddyr: For en vurdering af tilstanden for kvalitetselementet anvendes Dansk Kvalitetsindeks (DKI) som udtryk for bundfaunens sammensætning og tæthed. DKI afspejler den økologiske tilstand for blødbundsfaunaen. Det reelle indeks er DKI 2, som kompenserer for saltholdigheden i beregningerne af indekssværdien. Derudover er en lang række komponenter inkluderet i beregningen af indekset, herunder artsdiversitet og arternes følsomhed overfor salinitet, eutrofiering og iltforhold. Kvalitetselementet kan potentielt påvirkes ved fysisk påvirkning samt ophvirvling af sediment og efterfølgende sedimentation og vurderes relevant for uddybning og oprensning af sedimentmateriale.
- > Nationalt specifikke stoffer: Tilstanden vurderes på baggrund af forekomsten af nationalt specifikke stoffer. Kvalitetselementet kan potentielt påvirkes af frigivelse af miljøfarlige forurenende stoffer og vurderes relevant for uddybning og oprensning af sedimentmateriale.

I en tilstandsvurdering af den økologiske tilstand for kystvande anvendes de fysisk-kemiske kvalitetselementer, lysforhold (vandets klarhed) og iltforhold ved bunden samt de nationalt specifikke stoffer, som understøttende elementer.

Lys anvendes som et understøttende kvalitetselement og er fastlagt som lyskrav for vækst af ålegræs (og andre rodfæstede bundplanter). Lyskravet er fastlagt til, at der ved dybden, svarende til dybdegrænsen for hovedudbredelsen af ålegræs skal være mindst 16% af overfladelyset, for at rodfæstede bundplanter kan gro ud til dybdegrænsen mellem god og moderat tilstand. Men ifølge (Erftemeijer & Lewis, 2006) er minimumskraverne for, at ålegræs kan gro, at lysintensiteten ved bunden er større end ca. 20% af lysintensiteten ved havoverfladen. Til måling af den lysbegrænsende dybde for udbredelsen af rodfæstede bundplanter i kystvandområderne anvendes lyssvækkelse (K_d) og secchidybder (SD). Kvalitetselementet vurderes relevant for vandområde 232 Nissum Bredning.

Iltkoncentrationer kan påvirke de biologiske kvalitetselementer negativt, da rodfæstede bundplanter samt bundfauna kan dø ved for lavt iltindhold. Lavt iltindhold kan skyldes frigivelse af næringsstoffer, som kan lede til algeopblomstring der øger iltforbruget. Øget algevækst i algernes vækstsæson, kan forværre iltindholdet i vandet, når det biologiske materiale nedbrydes.

Der er defineret en række hydromorfologiske elementer, der understøtter de biologiske elementer, og disse inkluderer dybdevariation, bundforhold (struktur og substrat), tidevandszonens struktur, de dominerende strømmes retning samt bølgeeksponering. Derudover er der identificeret kemiske og fysisk-kemiske elementer, der understøtter de biologiske elementer. Udover iltforhold og vandets klarhed, inkluderer disse de termiske forhold, salinitet og næringsstofforhold. Dybdevariation og bundforhold påvirkes ved projektet ved at der sker en uddybning af området. Dybdevariation og bundforhold bliver kontinuerligt påvirket ved den kraftige strøm og tidevandsændringer, der forekommer i området grundet udviklingen af åbningen ind til Nissum Bredning fra Vesterhavet. Dermed vil der forsat ske en betydelig ændring af dybdevariationen og bundforholdene, eftersom området ikke har stabiliseret sig endnu. Næringsstofforholdene vil dog blive inkluderet i en vurdering af fytoplankton (klorofyl a).

Et af kriterierne for potentielle påvirkninger på vandområdeplanerne er om tilstanden for de enkelte kvalitetselementer påvirkes. For hvert kvalitetselement fremgår grænserne mellem de forskellige kvalitetsklasser i Bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder (BEK nr. 792 af 13/06/2023).

For den kemiske tilstand foretages en vurdering i forhold til de EU-prioriterede stoffer. Tilstanden kan potentielt påvirkes ved frigivelse af miljøfarlige forurenende stoffer. Vurderes relevant for uddybning og oprensning af sedimentmateriale.

På baggrund af ovenstående betragtninger, præsenteres en oversigt over, hvad der vil blive vurderet for det enkelte vandområde nedenfor (Tabel A-5).

Tabel A-5 Oversigt over potentielle påvirkninger på den økologiske og kemiske tilstand, samt hvilke kvalitetselementer, der er relevante for de identificerede vandområder for projektet.

Påvirkning	232 Nissum Bredning	133 Vesterhavet
Aktivitet	Uddybning og oprensning af delområdet S6 i Sælhundeholm Løb	Spredning af uddybnings- og oprensningsmateriale fra delområde S6
Påvirkning økologisk tilstand	> Ophvirvling af sediment, spild og efterfølgende sedimentation > Frigivelse af næringsstoffer > Frigivelse af miljøfarlige forurenende stoffer (nationalt specifikke stoffer) > Direkte fysisk påvirkning af havbunden	> Spredning af sediment, spild og efterfølgende sedimentation > Spredning af frigivet næringsstoffer > Spredning af frigivet miljøfarlige forurenende stoffer (nationalt specifikke stoffer)
Vurdering økologisk tilstand	> Ålegræs > Fytoplankton > Bundfauna > Nationalt specifikke stoffer > Iltforhold > Lysforhold	> Ålegræs > Fytoplankton > Bundfauna > Nationalt specifikke stoffer > Iltforhold > Lysforhold
Påvirkning kemisk tilstand	> Frigivelse af miljøfarlige forurenende stoffer (EU prioriterede stoffer)	> Spredning af miljøfarlige forurenende stoffer (EU prioriterede stoffer)
Vurdering kemisk tilstand	> Miljøkvalitetskrav for EU prioriterede stoffer	> Miljøkvalitetskrav for EU prioriterede stoffer

A.4.2 Vandområde 232 Nissum Bredning

Identificeret påvirkninger

Økologisk tilstand

- > Ophvirvling af sediment, spild og efterfølgende sedimentation
- > Frigivelse af næringsstoffer
- > Frigivelse af miljøfarlige forurenende stoffer (nationalt specifikke stoffer)
- > Direkte fysisk påvirkning af havbunden

Kemisk tilstand

- > Frigivelse af miljøfarlige forurenende stoffer (EU-prioriterede stoffer)

Generelle forudsætninger

Det antages, at metoden til uddybning og oprensning sker vha. en gravemaskine (COWI, 2024). Uddybningen og oprensning i vandområde 232 Nissum

Bredning vil foregå i sejlrenden i delområdet S6. Her er der dynamiske forhold grundet den ind- og udadgående strøm ind i Limfjorden og dermed en naturlig høj spredning og ophvirvling af sediment. Uddybningsmængden er 142.000 m³ og oprensingsmængden vil yderligere være 10.000 m³ i delområde S6.

Arbejdsperioden ved uddybningen svarer til 24-28 døgn ved et uddybningsfartøj (COWI, 2024).

Vurdering af påvirkning på vandområdets økologiske tilstand

Fytoplankton/klorofyl

Relevante identificerede påvirkninger:

> Frigivelse af næringsstoffer


Ved ophvirvling af sediment kan der frigives næringsstoffer til vandfasen, som kan give anledning til algeopblomstring og dermed påvirke fytoplankton-mængden i vandet. Tabel A-6 er en oversigt over den mængde frigivet kvælstof fosfor, der vil være under uddybningen af delområde S6 i sejlrenden.

Tabel A-6 *Potentiel næringsstoffrigivelse i sediment under uddybning.*

	Kvælstof	Fosfor
Total masse frigivet (kg)	1070	193
Initial konc. dvs. konc. der frigives til vandsøjlen, når sedimentet optages (µg/l)	151	27

En øget kvælstofkoncentration vil give anledning til en øget klorofyl-koncentration. En overordnet vurdering af de forventede størrelsesordener findes i (Håkansson.L., 2010), se Figur A-4.

Denne relation er afhængig af saltholdigheden og ved en saltholdighed på ca. 32 PSU findes klorofyl-a/Ntot-forholdet på ca. 0,008. Dermed vil en øgning af Ntot-koncentrationen med 151 µg Ntot/l umiddelbart under opgravningen resultere i en øgning af klorofylkoncentrationen på 1,2 µg klorofyl-a/l. Beregninger har vist at der i en afstand af 600 meter fra uddybningsfartøjet ikke vil være en øgning i kvælstofindholdet og dermed ikke en øget klorofyl-koncentration.



Figur A-4 Plot af feltmålinger der angiver klorofyl-a/Total N forholdet ved forskellige saltholdigheder. Plottet viser bedst regression fra saltholdigheder enten over eller under tærskelværdien på 10 PSU (Håkansson.L., 2010)

På baggrund af indholdet af kvælstof og fosfor vurderes der ikke at være en tilstandsforringelse af kvalitetselementet, fytoplankton, i vandområde 232 Nissum Bredning ved uddybning og oprensning af delområde S6.

Rodfæstede bundplanter/ålegræs

Relevante identificerede påvirkninger:

- > Frigivelse af næringsstoffer
- > Skygning
- > Direkte fysisk påvirkning af havbunden

Frigivelse af næringsstoffer

Kvalitetselementet for rod-fæstede bundplanter samt det understøttende kvalitetselement, iltforhold, kan påvirkes ved frigivelse af næringsstoffer, der kan lede til algeopblomstring og et øget iltforbrug.

På baggrund af ovenstående vedr. indholdet af kvælstof og fosfor vurderes der ikke at være en tilstandsforringelse af kvalitetselementet, rod-fæstede bundplanter, i vandområde 232 Nissum Bredning ved uddybning og oprensning af delområde S6.

Ophvirvling af sediment, spild og efterfølgende sedimentation

Kvalitetselementet for rodfæstede bundplanter samt det understøttende kvalitetselement, lysforhold, kan potentielt påvirkes ved sedimentfaner, der kan skygge for optagelse af sollys.

Da kvalitetselementet er defineret som dybdeudbredelsen vil ovenstående ilt- og lyspåvirkninger skulle vare over en relativ lang periode. Ålegræs kan overleve i op til en måned, selvom de konstant udsættes for lysforhold under minimumskravene for vækst (Erftemeijer & Lewis, 2006). Ålegræs er udelukkende følsom overfor skygning i vækstsæsonen, der forløber over seks måneder (april-september). Der er tale om en påvirkning på 24-28 døgn og der kan forekomme uddybning i løbet af ålegræssets vækstsæson.



Figur A-5 Oversigt over bundvegetation i den vestlige del af Limfjorden (DHI, Marine Vegetation Atlas , 2018).

Ifølge DHI's Marine Vegetation Atlas er udbredelsen af makroalger og ålegræs meget begrænset (Figur A-5). Endvidere er den generelle strømdynamik (DMI, 2024) i udmundingen til Vesterhavet ind- og udadgående og vil dermed ikke føre potentielt sedimentspild ind mod de kystnære områder i Limfjorden, hvor der findes større mængder af bundvegetation. Derfor vurderes der ikke at være en påvirkning på rodfæstede bundplanter i de kystnære områder i den vestlige del af Limfjorden grundet uddybning og oprensning af sejlrenden.

På baggrund af ovenstående vurderes der ikke at være en tilstandsforringelse ved skygning af kvalitetselementet, rodfæstede bundplanter, i vandområde 232 Nissum Bredning ved uddybning og oprensning af delområde S6.

Direkte fysisk påvirkning af havbunden

Det vurderes, at der ikke vil ske en tilstandsforringelse af kvalitetselementet, rodfæstede bundplanter i vandområdet 232 Nissum Bredning ved habitattab, da der er tale om en uddybning, som foregår i et begrænset område med en meget lokal påvirkning i delområde S6. Endvidere er udbredelsen af makroalger og ålegræs meget begrænset ifølge DHI's Marine Vegetation Atlas (Figur A-5). Derfor vurderes der ikke at være en påvirkning eller tilstandsforringelse af rodfæstede bundplanter i delområde S6 grundet uddybningen.

På baggrund af ovenstående vurderes der ikke at være en tilstandsforringelse ved habitattab af kvalitetselementet, rodfæstede bundplanter, i vandområde 232 Nissum Bredning ved uddybning og oprensning af delområde S6.

Bentiske invertebrater/bunddyr

Relevante identificerede påvirkninger:

> Direkte fysisk påvirkning af havbunden

Ved uddybning vil den eksisterende bundfauna i sejlrenden gå til grundet den fysiske påvirkning. Det vurderes dog, at der hverken vil være en høj artsrigdom eller antal af bunddyr, da der i overvejende grad er tale om en sejlrende, som tidligere er uddybet og oprenset.

Det vurderes, at der ikke vil ske en tilstandsforringelse af kvalitetselementet bundfauna i vandområdet 232 Nissum Bredning, da der er tale om en uddybning og oprensning, som foregår i et begrænset område med en meget lokal påvirkning i sejlrenden. Inden for 232 Nissum Bredning vil udvidelsen af sejlrenden bestå af den udvidelse, som kommer pga. dybdeudvidelsen og udvidelsen af sejlrenden fra 80 til 110 meter. Det betyder, at ny havbund vil udvides med ca. 2,9 ha, mens den totale påvirkning vil være 10,5 ha.

På baggrund af ovenstående vurderes der ikke at være en tilstandsforringelse ved habitattab af kvalitetselementet, bentiske invertebrater, i vandområde 232 Nissum Bredning ved uddybning og oprensning af delområde S6.

Næringsstoffer og målopfyldelse

Relevante identificerede påvirkninger:

> Frigivelse af næringsstoffer

Næringsstoffer kan frigives fra sedimentet under uddybning og udvidelse, da bundne næringsstoffer kan frigives fra sedimentet, når det føres gennem vandsøjlen.

For vandområde 232 Nisum Bredning, er der en baselinebelastning på 745,6 tons N/år, en målbelastning på 536,1 tons N/år og dermed et indsatsbehov på reducere af 209,5 tons kvælstof per år (Miljøministeriet, 2023). Der er dermed et indsatsbehov for kvælstof, og der må som udgangspunkt ikke tilføres mere kvælstof til vandområdet. Den beregnede mængde kvælstof, der frigives som følge af uddybningen i delområde S6 er 1,07 tons jf. Tabel A-6.

Det vurderes således, at frigivelse af kvælstof vil være til hinder for målopfyldelse af vandområdet 232 Nisum Bredning. Der er dog tale om et bidrag på 0,5 % i forhold til indsatsbehovet.

Miljøfarlige forurenende stoffer (nationalt specifikke stoffer)

Relevante identificerede påvirkninger:

> Frigivelse af miljøfarlige forurenende stoffer (nationalt specifikke stoffer)

Miljøfarlige forurenende stoffer kan ligeledes frigives fra sedimentet under uddybning og oprensning af delområde S6, når sedimentet opslæmmes og føres igennem vandsøjlen. De miljøfarlige forurenende stoffer (de nationalt specifikke stoffer), kan potentielt påvirke den økologiske tilstand.

Koncentrationer af miljøfarlige forurenende stoffer i sedimentet ses i Tabel A-7 under "Sediment". De nationalt specifikke stoffer på nær sum af methylnapthalener, ligger under de respektive miljøkvalitetskrav og vil således ikke medføre tilstandsforringelse ved uddybning og oprensning af sediment i vandområdet.

Der er således overskridelse af methylnapthalener i sedimentet fra nedenstående målinger jf. Tabel A-7 og fra tilstandsvurderingen jf. Vandområdeplanerne (MiljøGIS, 2024).

I FAQ 43 står:

*"For at sikre et tilstrækkeligt og ensartet miljøbeskyttelsesniveau bør miljømyn-
digheden derudover kun tillade en beregnet gennemsnitlig årlig stigning af kon-
centrationen i sedimentet som følge af en udledning på mindst mulig og ikke
mere end 1 % af værdien for miljøkvalitetskravet for sediment."*

Indholdet af methylnapthalener er i forvejen målt til 0,0117 mg/kg TS. Koncentrationen i det opgravede sediment er bestemt til den halve detektionsgrænse (0,16 mg/kg TS), da der i Nisum Bredning er fundet en koncentration på 0,0117 mg/kg TS vurderes det at dette er konservativt. Vægtes med at der spredes 5% i forbindelse med opgravning og at dette sediment alt sammen fordeles i vandområde 232 Nisum Bredning vil der forekomme en stigning på af koncentrationen 0,00002 mg/kg TS. J.f. FAQ 43 må stigning højst være

0,000035 mg/kg TS. hvorfor der ikke er en øgning af koncentrationen over 1% af miljøkvalitetskriteriet.

Der er ikke overskridelse af miljøkvalitetskravet (generelt kvalitetskrav eller maksimumkravet) ved beregning af den maksimale frigivne koncentration til vandsøjlen.

Frigivelsen af miljøfarlige forurenende stoffer til vandsøjlen er beregnet under uddybningen, hvilket ses i Tabel A-7 under "Andet overfladevand". De nationalt specifikke stoffer, ligger alle under de respektive miljøkvalitetskrav og vil således ikke medføre tilstandsforringelse ved uddybning af sediment i vandområdet. Det vurderes således, at uddybning og oprensning og dermed frigivelse af de nationalt specifikke stoffer i overfladevand ikke vil medføre tilstandsforringelse i vandområde 232 Nissum Bredning.

Tabel A-7 Oversigt over de målte nationalt specifikke stoffer, maks. konc. i sediment, sedimentkvalitetskrav, maks. konc. der frigives til vandsøjlen, generelle kvalitetskrav og maksimumkoncentrationen under uddybningen i delområde S6 i sejlrenden. SKK: Sedimentkvalitetskrav (BEK 796 af 13/6/2023). SKKriterie: Sedimentkvalitetskriterie i danske datablade. PNEC: EU predicted no effect conc. Fremhævede tal beskriver hvor den målte koncentration ligger over sedimentkvalitetskrav, sedimentkvalitetskriterie eller EU predicted no effect conc.

Nationalt specifikke stoffer (økologisk tilstand)	Sediment		Reference	Andet overfladevand		
	Maksimal konc. i sediment (mg/kg TS)	Sedimentkvalitetskrav, sedimentkvalitetskriterie eller EU predicted no effect conc. (mg/kg TS)		Maksimalt frigivet konc. (µg/l)	Generelt kvalitetskrav (µg/l)	Maksimumkoncentration (µg/l)
Arsen, As	6,2	35,7	PNEC	2,29	2+0,6*	2+1,1*
Krom, Cr VI	15	69,2**	SKKriterie	0,74	3,4	17
Kobber, Cu	8,2	676	PNEC	0,88	0,845+1 *****	0,845+2 *****
Zink, Zn	34	162,2	PNEC	3,29	7,8	8,4
Phenanthren	<0,010*** *	0,058***	SKKriterie	0,000013	1,3	4,1
Pyren	<0,010*** *	0,062***	SKKriterie	0,000013	0,0017	0,023
Benzo(a)anthracen	<0,010*** *	0,0044** *	SKKriterie	0,000013	0,0012	0,018
Chrysen	<0,010*** *	0,0034** *	SKKriterie	0,000013	0,0014	0,014
Sum af methylnaftalener (PAH)	<0,32	0,0035** *	SKK	0,0023	0,12	2

*her er det generelle kvalitetskrav (0,6 ug/l) og maksimumkoncentrationen (1,1 ug/l) tillagt den naturlige baggrundskoncentration (2 ug/l).

**SKKriteriet for krom er 9,2 mg/kg TS tillagt den naturlige baggrundskoncentration. OSPARs Background Concentration (BC) anvendes som den naturlige baggrundskoncentration (Miljøstyrelsen, 2024).

***Beregnet med en F_{oc} på 0,74% (målt i ler i S5-4).

**** Sum af PAH er ikke påvist

***** et generelle kvalitetskrav (1 ug/l) og maksimumkoncentrationen (2ug/l) tillagt den naturlige baggrundskoncentration (0,845 ug/l).

Vurdering af påvirkning på vandområdets kemiske tilstand

Relevante identificerede påvirkninger:

- > Frigivelse af miljøfarlige forurenende stoffer (EU-prioriterede stoffer)

Uddybning og oprensning af sediment vil potentielt kunne påvirke den kemiske tilstand i vandområdet 232 Nisum Bredning ved frigivelse af EU-prioriterede stoffer, når sedimentet føres igennem vandsøjlen. Der vil potentielt være risiko for flere miljøfarlige stoffer, når der arbejdes i sejlrender, derfor undersøges sedimentet for en række miljøfarlige forurenende stoffer (COWI, 2024).

Vandområdet er allerede i den dårligste kemiske tilstandsklasse (ikke-god kemisk tilstand), da der er overskridelse af miljøkvalitetskravet for bly (sediment). Jf. Tabel A-8 ses det, at bly ligger under det respektive miljøkvalitetskrav og således ikke vil medføre tilstandsforringelse ved uddybning og oprensning af sediment i vandområdet.

Koncentrationer af miljøfarlige forurenende stoffer i sedimentet ses i Tabel A-8 under "Sediment". De fleste EU-prioriterede stoffer ligger under de respektive miljøkvalitetskrav i sedimentet jf. Tabel A-8 og vil således ikke medføre tilstandsforringelse ved uddybning og oprensning af sediment i vandområdet.

Der er en overskridelse af tributyltin-cation (TBT) i sedimentet. I analysekvalitetsbekendtgørelsen er det angivet, at detektionsgrænsen skal være under 1 $\mu\text{g Sn/kg TS}$. I dette projekt er TBT målt til $<0,4093 \mu\text{g Sn/kg TS}$ og 1,023 svarende til en koncentration på $<1 \mu\text{g TBT/kg TS}$, og $<2,5 \mu\text{g TBT/kg TS}$. Den høje værdi er fra en prøve udtaget i 2018 i sand og ikke i Agger ler.

Som en konservativ betragtning antages at indholdet af TBT ligger på miljøkvalitetskriteriet i forvejen, (0,00019 mg/kg TS). Koncentrationen er bestemt til den halve detektionsgrænse (0,0005 mg/kg TS). Vægtes med, at der spredes 5% i forbindelse med opgravning, og at dette sediment alt sammen fordeles i vandområde 232 Nisum Bredning, vil der forekomme en stigning på $9,5 \cdot 10^{-8}$. Sammenlignes denne stigning med at der ikke må forekomme en stigning på over 5% af miljøkvalitetskriteriet ($9,5 \cdot 10^{-6} \text{ mg/kg TS}$) jf. beregningsmetode anvist i FAQ 43 og 44. Kan det konkluderes, at frigivelse af TBT i forbindelse med oprensningen er en faktor 100.

Frigivelsen af miljøfarlige forurenende stoffer til vandsøjlen er beregnet under uddybning, hvilket ses i Tabel A-8 under "Andet overfladevand". De EU-prioriterede stoffer målt i sedimentet ligger alle under de respektive miljøkvalitetskrav (jf. Tabel A-8), og vil således ikke medføre tilstandsforringelse ved uddybning af sediment i vandområdet. Det vurderes således, at uddybning oprensning og dermed frigivelse af de EU-prioriterede stoffer i overfladevand ikke vil medføre tilstandsforringelse i vandområde 232 Nisum Bredning.

Tabel A-8 *Oversigt over de målte nationalt specifikke stoffer, maks. konc. i sediment, sedimentkvalitetskrav, maks. konc. der frigives til vandsøjlen, generelle kvalitetskrav og maksimumkoncentrationen under uddybningen i delområde S6 i sejlrenden. SKK: Sedimentkvalitetskrav (BEK 796 af 13/6/2023). SKKriterie: Sedimentkvalitetskriterie i danske datablade. PNEC: EU predicted no effect conc. Fremhævede tal beskriver hvor den målte koncentration ligger over sedimentkvalitetskrav, sedimentkvalitetskriterie eller EU predicted no effect conc.*

Sediment			Andet overfladevand			
EU-prioriterede stoffer	Maksimal konc. i sediment (mg/kg TS)	Sedimentkvalitetskrav, sedimentkvalitetskriterie eller EU predicted no effect conc (mg/kg TS)	Reference	Maksimalt frigivet konc. (µg/l)	Generelt kvalitetskrav (µg/l)	Maksimumkoncentration (µg/l)
Tributyltin-cation	<0,0025	0,00019****	SKKriterie	0,000025	0,0002	0,0015
Bly, Pb	8,3	163	SKK	0,10	1,3	14
Cadmium, Cd	0,1	5,8**	SKK	0,03	0,2	0,45
Kviksølv, Hg	0,17	9,3	PNEC	0,0047	-	0,07
Nikkel, Ni	14	17,2***	SKKriterie	0,96	8,6	34
Anthracen	<0,010*****	0,00071****	SKK	0,000013	0,1	0,1
Fluoranthen	0,013	0,52****	SKKriterie	0,000015	0,0063	0,12
Benz(a)pyren*	<0,010*****	0,0010***	SKKriterie	0,000013	0,00017	0,027
4-tert-oc-tylphenol	<0,0010	0,029****	SKK	-	0,01	Anvendes ikke
Bromerede flamme-hæmmere	<0,0030	-			-	0,014
PFOS	0,000059	-		0,000000695	0,00013	7,2

*Benz(a)pyren er indikator for om PAH'erne overholder miljøkvalitetskravet.

**SKK for cadmium er 3,8 mg/kg TS tillagt den naturlige baggrundskoncentration. Som den naturlige baggrundskoncentration er der i tabellen anvendt 2 mg/kg.

***SKKriteriet for nikkel er 6,8 mg/kg TS tillagt den naturlige baggrundskoncentration. Som den naturlige baggrundskoncentration er der i tabellen anvendt 10,4 mg/kg TS (DCE, 2014).

****Beregnet med en F_{oc} på 0,74% (målt i ler i S5-4).

***** Sum af PAH er ikke påvist.

Sammenfattende vurdering af påvirkninger på det målsatte vandområde

Det konkluderes, at der ikke vil ske en tilstandsforringelse på den økologiske tilstand i vandområde 232 Nissum Bredning i både anlægs- og driftsfasen. Dette skyldes, at tilstanden for de biologiske kvalitetselementer ålegræs, bundfauna og klorofyl samt de nationalt specifikke stoffer ikke forringes ved uddybning og oprensning af sejlrenden.

Det konkluderes ligeledes, at der ikke vil ske en tilstandsforringelse af den kemiske tilstand i både anlægs- og driftsfasen, da der ikke er overskridelse af miljøkvalitetskravene i vandsøjlen for de EU-prioriterede stoffer i vandområdet under uddybning og oprensning af sejlrenden.

Der er fastsat et indsatsbehov for kvælstof i vandområdet, hvorfor projektet vil hindre målopfyldelse, da der frigives kvælstof i forbindelse med uddybning og oprensning af sejlrenden.

A.4.3 Vandområde 133 Vesterhavet, nord

Identificeret påvirkninger:

Økologisk tilstand

- > Spredning af sediment, spild og efterfølgende sedimentation
- > Spredning af næringsstoffer
- > Spredning af miljøfarlige forurenende stoffer (nationalt specifikke stoffer)

Kemisk tilstand

- > Spredning af miljøfarlige forurenende stoffer (EU-prioriterede stoffer)

Generelle forudsætninger

Det antages, at metoden til uddybning og oprensning sker vha. en gravemaskine (COWI, 2024). Uddybningen og oprensning i delområde S6 af sejlrenden overlapper ikke med vandområde 133 Vesterhavet, nord. Dog kan der forekomme spredning af sediment ind i vandområde 133 Vesterhavet, nord og potentielt påvirke dets tilstand. Her er der dynamiske forhold grundet den ind- og udadgående strøm ind i Limfjorden og dermed en naturlig høj spredning og opvirling af sediment. Uddybningsmængden er 142.000 m³ og oprensningsmængden vil yderligere være 10.000 m³ i delområde S6.

Arbejdsperioden ved uddybningen svarer til 24-28 døgn ved et uddybningsfartøj (COWI, 2024).

Vurdering af påvirkning på vandområdets økologiske tilstand

Fytoplankton/klorofyl

Relevante identificerede påvirkninger:

- > Spredning af næringsstoffer

Ved potentiel spredning af sediment fra delområde S6 til vandområde 133 Vesterhavet, nord kan der frigives og spredes næringsstoffer til vandfasen, som kan give anledning til algeopblomstring og dermed påvirke fytoplankton-mængden i vandet. Tabel A-6 i afsnit A.4.2 er en oversigt over den mængde frigivet kvælstof fosfor, der vil være under uddybningen af delområde S6 i sejlrenden.

En øget kvælstofkoncentration vil give anledning til en øget klorofyl-koncentration. En overordnet vurdering af de forventede størrelsesordener findes i (Håkansson.L., 2010), se Figur A-4 i afsnit A.4.2.

Denne relation er afhængig af saltholdigheden og ved en saltholdighed på ca. 32 PSU findes klorofyl-a/Ntot-forholdet på ca. 0,008. Dermed vil en øgning af Ntot-koncentrationen med 151 µg Ntot/l umiddelbart under opgravningen resultere i en øgning af klorofylkoncentrationen på 1,2 µg klorofyl-a/l. Beregninger har vist at der i en afstand af 600 meter fra uddybningsfartøjet ikke vil være en øgning i kvælstofindholdet og dermed ikke en øget klorofyl-koncentration.

På baggrund af indholdet af kvælstof og fosfor samt afstand fra uddybningsområde til vandområdet, vurderes der ikke at være en tilstandsforringelse af kvalitetselementet, fytoplankton, i vandområde 133 Vesterhavet, nord ved uddybning og oprensning af delområde S6.

Rodfæstede bundplanter/ålegræs

Relevante identificerede påvirkninger:

- > Spredning af sediment, spild og efterfølgende sedimentation
- > Spredning af næringsstoffer

Spredning af sediment, spild og efterfølgende sedimentation

Kvalitetselementet for rodfæstede bundplanter samt det understøttende kvalitetselement, lysforhold, kan potentielt påvirkes sedimentfaner, der kan skygge for optagelse af sollys.

Da kvalitetselementet er defineret som dybdeudbredelsen vil ovenstående ilt -og lyspåvirkninger skulle vare over en relativ lang periode. Ålegræs kan overleve i op til en måned, selvom de konstant udsættes for lysforhold under minimums-kravene for vækst (Erftemeijer & Lewis, 2006). Ålegræs er udelukkende følsom overfor skygning i vækstsæsonen, der forløber over seks måneder (april-september). Der er tale om en påvirkning på 24-28 døgn og der kan forekomme uddybning i løbet af ålegræssets vækstsæson.

Ifølge DHI's Marine Vegetation Atlas er udbredelsen af makroalger og ålegræs meget begrænset (se Figur A-5 i afsnit A.4.2). Endvidere er den generelle strømdynamik (DMI, 2024) i udmundingen til Vesterhavet ind- og udadgående og vil dermed ikke føre potentielt sedimentspild ind mod de kystnære områder i Limfjorden, hvor der findes større mængder af bundvegetation. Derfor vurderes der ikke at være en påvirkning på rodfæstede bundplanter i de kystnære områder i den vestlige del af Limfjorden grundet uddybning og oprensning af delområde S6 i sejlrenden.

På baggrund af ovenstående samt afstanden fra uddybningsområdet til vandområdet vurderes der ikke at være en tilstandsforringelse ved sedimentfaner af kvalitetselementet, rodfæstede bundplanter, i vandområde 133 Vesterhavet, nord ved uddybning og oprensning af delområde S6.

Spredning af næringsstoffer

Kvalitetselementet for rodfæstede bundplanter samt det understøttende kvalitetselement, iltforhold, kan påvirkes ved frigivelse af næringsstoffer, der kan lede til algeopblomstring og et øget iltforbrug.

På baggrund af indholdet af kvælstof og fosfor, afstanden fra uddybningsområdet til vandområdet samt strømdynamik vurderes der ikke at være en tilstandsforringelse af kvalitetselementet, rodfæstede bundplanter, i vandområde 133 Vesterhavet, nord ved uddybning og oprensning af delområde S6.

Bentiske invertebrater/bunddyr

Relevante identificerede påvirkninger:

- > Spredning af sediment, spild og efterfølgende sedimentation

Ved uddybning og oprensning og spredning af sedimentfaner kan den eksisterende bundfauna blive tildækket og gå til grundet den fysiske påvirkning. Det vurderes dog, at grundet afstand og strømdynamik i området, at der vil være en lille sandsynlighed for at sedimentfaner vil give anledning til tilstandsforringelse af bentiske invertebrater i vandområdet 133 Vesterhavet, nord.

På baggrund af ovenstående vurderes der ikke at være en tilstandsforringelse ved tildækning grundet sedimentfaner af kvalitetselementet, bentiske invertebrater, i vandområde 133 Vesterhavet nord ved uddybning og oprensning af delområde S6.

Næringsstoffer og målopfyldelse

Relevante identificerede påvirkninger:

- > Spredning af næringsstoffer

Næringsstoffer kan frigives fra sedimentet under uddybning og oprensning i delområde S6, da bundne næringsstoffer kan frigives fra sedimentet, når det føres gennem vandsøjlen.

For vandområde 133 Vesterhavet, nord er der en baselinebelastning på 6482 tons N/år og en målbelastning på 7237,2 tons N/år (Miljøministeriet, 2023a). Der er således ikke et indsatsbehov for kvælstof i vandområdet. Den beregnede mængde kvælstof, der frigives, ligger på 1,07 tons jf. (COWI, 2024). Der er dermed tale om et bidrag på 0,01 % i forhold til indsatsbehovet.

På baggrund af ovenstående samt afstanden fra uddybningsområdet til vandområdet vurderes det, at spredning af kvælstof ikke vil være til hinder for målopfyldelse af vandområdet 133 Vesterhavet, nord.

Miljøfarlige forurenende stoffer (nationalt specifikke stoffer)

Relevante identificerede påvirkninger:

> Spredning af miljøfarlige forurenende stoffer (nationalt specifikke stoffer)

Miljøfarlige forurenende stoffer kan ligeledes frigives fra sedimentet under uddybningen, når sedimentet opslæmmes og føres igennem vandsøjlen. De miljøfarlige forurenende stoffer (de nationalt specifikke stoffer), kan potentielt påvirke den økologiske tilstand ved at blive spredt fra uddybningsområdet S6 til vandområde 133 Vesterhavet, nord.

Koncentrationer af miljøfarlige forurenende stoffer i sedimentet der uddybes i delområde S6 ses i Tabel A-7 under "Sediment" i afsnit A.4.2. De nationalt specifikke stoffer på nær sum af methylnapthalener, ligger under de respektive miljøkvalitetskrav og vil således ikke medføre tilstandsforringelse ved uddybning og oprensning af sediment i delområde S6 i vandområde 133 Vesterhavet, nord via spredning.

Der er således overskridelse af methylnapthalener i sedimentet fra nedenstående målinger jf. Tabel A-7 og fra tilstandsvurderingen jf. Vandområdeplanerne (MiljøGIS, 2024).

Der kan således være overskridelse af methylnapthalener i sedimentet der uddybes i delområde S6, analyserne viser dog alle at ligger under detektionsgrænsen for alle fire stoffer.

Som en konservativ betragtning antages, at indholdet af methylnapthalener ligger på miljøkvalitetskriteriet i forvejen, (0,0035 mg/kg TS). Koncentrationen er bestemt til den halve detektionsgrænse (0,16 mg/kg TS), da der i Nordsøen er fundet en koncentration på 0,005 mg/kg TS, og dermed vurderes det, at dette er konservativt scenarie. Vægtes med, at der spredes 5% i forbindelse med uddybning og at dette sediment (spil) alt sammen fordeles i vandområde 133 Vesterhavet, nord, vil der ikke forekomme en stigning på over 1% af miljøkvalitetskriteriet (0,0035 mg/kg TS) jf. beregningsmetode anvist i FAQ 43 og 44.

Der er ikke overskridelse af miljøkvalitetskravet (generelt kvalitetskrav eller maksimumkravet) ved beregning af den maksimale frigivne koncentration til vandsøjlen. Der gøres endvidere opmærksom på at sandsynligheden for at methylnapthalener spredtes til vandområde 133 Vesterhavet, nord fra uddybningsområdet S6 og forringer tilstanden er meget lille grundet afstanden og strømdynamik. Dermed vurderes det, at der ikke vil medføres en tilstandsforringelse af methylnapthalener i vandområde 133 Vesterhavet, nord ved uddybning og oprensning af sediment i delområde S6.

Frigivelsen af miljøfarlige forurenende stoffer til vandsøjlen er beregnet under uddybningen, hvilket ses i Tabel A-7 i afsnit A.4.2 under "Andet overfladevand". De nationalt specifikke stoffer målt i sejlrenden, ligger alle under de respektive miljøkvalitetskrav og vil således ikke medføre tilstandsforringelse ved uddybning af sediment i vandområdet. Det vurderes således, at uddybning og oprensning og dermed frigivelse af de nationalt specifikke stoffer i overfladevand fra delområde S6 ikke vil medføre tilstandsforringelse i vandområde 133 Vesterhavet, nord.

Vurdering af påvirkning på vandområdets kemiske tilstand

Relevante identificerede påvirkninger:

- > Spredning af miljøfarlige forurenende stoffer (EU-prioriterede stoffer)

Uddybning af sediment i delområde S6 vil potentielt kunne påvirke den kemiske tilstand i vandområdet 133 Vesterhavet, nord ved spredning af EU-prioriterede stoffer, når sedimentet føres igennem vandsøjlen. Der vil potentielt være risiko for flere miljøfarlige stoffer, når der arbejdes i sejlrender, derfor undersøges sedimentet i sejlrenden for en række miljøfarlige forurenende stoffer (COWI, 2024).

Vandområde 133 Vesterhavet, nord er allerede i den dårligste kemiske tilstandsklasse (ikke-god kemisk tilstand), da der er overskridelse af miljøkvalitetskravene for hhv. BDE (biota), octylphenoler (sediment) og kviksølv (biota). Jf. Tabel A-8 ses det, at BDE, octylphenoler og kviksølv ligger under de respektive miljøkvalitetskrav og vil således ikke medføre tilstandsforringelse ved uddybning og oprensning i delområde S6 i vandområde 133 Vesterhavet, nord via spredning.

Koncentrationer af miljøfarlige forurenende stoffer i sedimentet der uddybes i delområdes S6 ses i Tabel A-8 under "Sediment". De fleste EU-prioriterede stoffer, ligger under de respektive miljøkvalitetskrav i sedimentet og vil således ikke medføre tilstandsforringelse ved uddybning og oprensning af sediment i delområde S6 i vandområde 133 Vesterhavet, nord via spredning.

Der er muligvis en overskridelse af tributyltin-cation (TBT) i sedimentet, hvilket er usikkert, da miljøkvalitetskriteriet er lavere end detektionsgrænsen. I analysekvalitetsbekendtgørelsen er det angivet, at detektionsgrænsen skal være under 1 µg Sn/kg TS. I dette projekt er TBT målt til <0,4093 µg Sn/kg TS svarende til en koncentration på <1 µg TBT/kg TS. Som en konservativ betragtning

antages at indholdet af TBT ligger på miljøkvalitetskriteriet i forvejen, (0,00019 mg/kg TS). Koncentrationen er bestemt til den halve detektionsgrænse (0,0005 mg/kg TS). Vægtes med, at der spredes 5% i forbindelse med opgravning, og at dette sediment (spild) alt sammen fordeles i vandområde 133 Vesterhavet, nord, vil der ikke forekomme en stigning på over 5% af miljøkvalitetskriteriet (0,00019 mg/kg TS) jf. beregningsmetode anvist i FAQ 43 og 44.

Der er ikke overskridelse af miljøkvalitetskravet (generelt kvalitetskrav eller maksimumkravet) ved beregning af den maksimale frigivne koncentration til vandsøjlen. Der gøres endvidere opmærksom på at sandsynligheden for at de EU-prioriterede stoffer spredes til vandområde 133 Vesterhavet, nord fra uddybningsområdet S6 og forringer tilstanden er meget lille grundet afstanden og strømdynamik. Dermed vurderes det, at der ikke vil medføres en tilstandsforringelse af EU-prioriterede stoffer i vandområde 133 Vesterhavet, nord ved uddybning og oprensning af sediment i delområde S6.

Frigivelsen af miljøfarlige forurenende stoffer til vandsøjlen er beregnet under uddybningen, hvilket ses i Tabel A-8 under "Andet overfladevand". De EU-prioriterede stoffer, ligger alle under de respektive miljøkvalitetskrav og vil således ikke medføre tilstandsforringelse ved uddybning af sediment i vandområdet. Det vurderes således, at uddybning og oprensning og dermed frigivelse af de EU-prioriterede stoffer i overfladevand fra delområde S6 ikke vil medføre tilstandsforringelse i vandområde 133 Vesterhavet, nord.

Sammenfattende vurdering af påvirkninger på det målsatte vandområde

Det konkluderes, at der ikke vil ske en tilstandsforringelse på den økologiske tilstand i vandområde 133 Vesterhavet, nord i både anlægs- og driftsfasen. Dette skyldes, at tilstanden for de biologiske kvalitetselementer bundfauna og klorofyl samt de nationalt specifikke stoffer ikke forringes ved uddybning og oprensning af sejlrenden i delområde S6.

Det konkluderes ligeledes, at der ikke vil ske en tilstandsforringelse af den kemiske tilstand i både anlægs- og driftsfasen, da der ikke er overskridelse af miljøkvalitetskravene i vandsøjlen for de EU-prioriterede stoffer i vandområdet.

For kvælstof er der beregnet en frigivelse på 1,07 tons, som ikke vil være til hinder for mål opfyldelse i vandområdet.

A.4.4 Kumulativ påvirkning

Det er en mængde på 142.000 m³, som skal uddybes for at opnå en vanddybde på -12,05 m DVR90 i S6. Hertil kommer en mængde på ca. 313.000 m³ sediment, der yderligere skal uddybes fra delområderne S1 til S5 (ansøgt hos Kystdirektoratet). Dette giver i alt en kumulativ mængde på ca. 455.000 m³.

Det skal bemærkes, at den samlede mængde sediment, der er opgravet og godkendt i den tidligere eksisterende ansøgning ("Tilladelse til uddybning, og

mindre forskydning, af sejlrønde ved Thyborøn Havn, Lemvig Kommune" fra Kystdirektoratet (J.nr. 19/01631-41)) på 714.000 m³, nu ønskes forøget med yderligere ca. 191.000 m³.

Oprensningsmængden i indsejlingen til Thyborøn Havn har i gennemsnit været på 110.000 m³ om året, og i fyrlinjen er der gennemsnitligt oprenset 18.000 m³ om året. For oprensningen i Sydhavnen (S6) tillægges yderligere 10.000 m³ om året, dvs. i alt kumulativ ca. 140.000 m³ om året. Der forekommer desuden en signifikant sedimentation i Nissum Bredning (Rambøll, Miljøkonsekvensrapport - Kystbeskyttelse Lodbjerg Nymindegab Hovedrapport, udarbejdet for Kystdirektoratet, 2020).

Det mest sandsynlige vil være at uddybningen og oprensningen foretages samtidig, da det er nødvendigt at fjerne sandet fra overfladen før der foretages uddybningen i det underliggende lerlag.

Det vurderes, at der vil være en mindre stigning af oprensningsmængden med den øgede dybde og bredde. DHI har i 2008 estimeret dette til at være ca. 10% af den tidligere mængde. Den kumulativ mængde indeholder både uddybning (i alt 455.000 m³) og oprensning (årlig ca. 140.000 m³) da disse kan forekomme samtidig. Den kumulative mængde bliver derfor 595.000 m³.

Spildet i forbindelse med uddybningen er vurderet at være 5%. Det betyder at der spildes i alt 7.100 m³ i forbindelse med uddybningen i S6 og kumulativ ca. 29.750 m³.

Det vurderes ikke at den kumulative effekt af uddybningen og oprensningen i alle delområderne S1-S6 i Thyborøn sejlrønde vil påvirke tilstanden eller målopfyldelsen i vandområderne 232 Nissum Bredning eller 133 Vesterhavet, nord.

Vurdering af kumulative effekter ift. Havstrategien omfatter yderligere flere projekter i området omkring Sælhundeholm Løb der beskrives og vurderes i afsnit 5. Der skal bl.a. foregå:

- > Kystfodring på den Jyske Vestkyst Agger og Harbøre Tanger (se yderligere beskrivelse og vurdering i afsnit 5)
- > Oprensning i sejlrønden til Thyborøn Agger færgeren (se yderligere beskrivelse og vurdering i afsnit 5)
- > Anlæggelsen af Thyborøn Havn etape 3 og 4 (se yderligere beskrivelse og vurdering i afsnit 5)
- > Uddybning af S1 til S5 i Thyborøn Kanal

Tabel A-9 Opsummering af vandområdevurderinger for uddybning og oprensning af sedimentmateriale fra Thyborøn sejlrende S1 til S5.

Vandområder	Opsummering
133 Vesterhavet, nord	Det konkluderes, at der ikke vil ske en tilstandsforringelse på den økologiske tilstand i vandområde 133 Vesterhavet, nord. Dette skyldes, at tilstanden for de biologiske kvalitets-elementer bundfauna og klorofyl samt de nationalt specifikke stoffer ikke forringes ved uddybning, udvidelse og oprensning i sejlrenden. Det konkluderes ligeledes, at der ikke vil ske en tilstandsforringelse af den kemiske tilstand, da der ikke er overskridelse af miljøkvalitetskravene i vandsøjlen for de EU-prioriterede stoffer i vandområdet. Det konkluderes, at uddybning og oprensning ikke vil hindre målopfyldelse, da der ikke er kvælstofindsatser i vandområdet.
232 Nisum Bredning	Det konkluderes, at der ikke vil ske en tilstandsforringelse på den økologiske tilstand i vandområde 232 Nisum Bredning. Dette skyldes, at tilstanden for de biologiske kvalitets-elementer ålegræs, bundfauna og klorofyl samt de nationalt specifikke stoffer ikke forringes ved uddybning, udvidelse og oprensning i sejlrenden. Det konkluderes ligeledes, at der ikke vil ske en tilstandsforringelse af den kemiske tilstand, da der ikke er overskridelse af miljøkvalitetskravene i vandsøjlen for de EU-prioriterede stoffer i vandområdet. Det konkluderes, at uddybning, udvidelse og oprensning vil hindre målopfyldelse, eftersom der allerede er et indsatsbehov for kvælstof i vandområdet.

A.5 Opsummering

Tabel A-10 opsummerer den samlede vurdering af uddybningen i delområde S6 (anlægsfasen) og de efterfølgende oprensninger (driftsfasen).

Tabel A-10 Opsummering af vandområdevurderinger for uddybning og oprensning af sedimentmateriale fra Sælhundeolm Løb (S6).

Vandområder	Opsummering (anlægs- og driftsfase)
232 Nisum Bredning	Det konkluderes, at der ikke vil ske en tilstandsforringelse på den økologiske tilstand i vandområde 232 Nisum Bredning i både anlægs- og driftsfasen. Dette skyldes, at tilstanden for de biologiske kvalitetselementer ålegræs, bundfauna og klorofyl samt de nationalt specifikke stoffer ikke forringes ved uddybning og oprensning af sejlrenden. Det konkluderes ligeledes, at der ikke vil ske en tilstandsforringelse af den kemiske tilstand i både anlægs- og driftsfasen, da der ikke er overskridelse af miljøkvalitetskravene i vandsøjlen for de EU-prioriterede stoffer i vandområdet under uddybning og oprensning af sejlrenden.

Vandområder	Opsummering (anlægs- og driftsfase)
	Der er fastsat et indsatsbehov for kvælstof i vandområdet, hvorfor projektet vil hindre målopfyldelse, da der frigives kvælstof i forbindelse med uddybning og oprensning af sejlrenden.
133 Vesterhavet, nord	Det konkluderes, at der ikke vil ske en tilstandsforringelse på den økologiske tilstand i vandområde 133 Vesterhavet, nord i både anlægs- og driftsfasen. Dette skyldes, at tilstanden for de biologiske kvalitetselementer bundfauna og klorofyl samt de nationalt specifikke stoffer ikke forringes ved uddybning og oprensning af sejlrenden i delområde S6. Det konkluderes ligeledes, at der ikke vil ske en tilstandsforringelse af den kemiske tilstand i både anlægs- og driftsfasen, da der ikke er overskridelse af miljøkvalitetskravene i vandsøjlen for de EU-prioriterede stoffer i vandområdet. For kvælstof er der beregnet en frigivelse på 1,07 tons, som ikke vil være til hinder for målopfyldelse i vandområdet.

Tages de kumulative effekter med ændres der ikke på ovenstående konklusioner.

Appendix B Havstrategidirektiv

B.1 Lovgrundlag og afgrænsning


Formålet med Havstrategidirektivet (Rådets direktiv nr. 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger) er at sikre god miljøtilstand i alle europæiske havområder inden 2020. Danmark er gennem havstrategidirektivet forpligtet til at opretholde en god miljøtilstand i de danske havområder.

I Danmark er Havstrategidirektivet udmøntet i Bekendtgørelse af lov om havstrategi (Nr. 1161 af 25/11/2019 af lov om havstrategi). Loven har til formål at fastlægge rammerne for de foranstaltninger, der skal gennemføres for at opnå eller opretholde god miljøtilstand i havets økosystemer og muliggøre en bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer. Offentlige myndigheder er ved udøvelsen af deres opgaver forpligtede til ikke at handle i modstrid med de mål og indsatser, der fastlægges i havstrategien.

Havstrategien omfatter generelt danske havområder, herunder havbund og undergrund, på søterritoriet og i de eksklusive økonomiske zoner. Havstrategien finder dog ikke anvendelse på de havområder, der strækker sig ud til 1 sømil uden for basislinjen i det omfang, områderne er omfattet af lov om vandplanlægning og indsatser, der indgår i en vedtaget Natura 2000-plan efter miljømålsloven.

Afgrænsningen betyder eksempelvis, at havstrategien ikke omhandler tilstanden for fytoplankton, rodfæstede bundplanter og bundfauna i vandområder, der strækker sig ud til 1 sømil fra basislinjen, da disse emner varetages af vandområdeplanerne. Andre elementer i havstrategien som f.eks. undervandsstøj og marint affald er dækket i hele det marine område også inden for grænsen 1 sømil fra basislinjen.

Projektområdet for forundersøgelsen er lokaliseret i et område indenfor basislinjen, hvilket betyder, at den danske havstrategi kun dækker i de tilfælde, hvor vandrammedirektivet ikke dækker (Figur B-1).



Figur B-1 De danske havområder hvor grænsen for basislinjen (kyst) til 1 sømil vises og fra den grænse ud til 12 sømil. Derudover vises den danske eksklusive økonomiske zone (Miljø og Fødevareministeriet, 2019).

Havstrategidirektivet er inddelt i 11 emner (deskriptorer), der hver især beskriver en række tilstandselementer og påvirkninger i havmiljøet. Deskriptorerne giver tilsammen en helhedsorienteret vurdering af havmiljøets tilstand. Danmark skal i den nationale havstrategi beskrive god miljøtilstand på grundlag af disse 11 kvalitative deskriptorer.

Den danske havstrategi omfatter følgende deskriptorer:

- > Biodiversitet (D1)
- > Ikke hjemmehørende arter (D2)
- > Erhvervsmæssigt udnyttede fiskebestande (D3)
- > Havets fødenet (D4)
- > Eutrofiering (D5)
- > Havbundens integritet (D6)
- > Hydrografiske ændringer (D7)
- > Forurenende stoffer (Miljøfarlige stoffer) (D8)
- > Forurenende stoffer i fisk og skaldyr til konsum (D9)
- > Marint affald (D10)
- > Undervandsstøj (D11)

B.2 Potentielle påvirkninger

En mindre del af de planlagte projektaktiviteter kan potentielt påvirke det marine miljø og er dermed relevant at vurdere ift. havstrategien. Tabel B-1 giver en oversigt over potentielle påvirkninger.

Tabel B-1 Oversigt over projektets potentielle påvirkninger, der vurderes at være relevante i forhold til havstrategidirektivet.

Projektfase	Potentielle påvirkninger af omgivelserne
Anlægsfase	> Ophvirvling af sediment, spild og efterfølgende sedimentation > Frigivelse af næringsstoffer > Frigivelse af miljøfarlige forurenende stoffer > Undervandsstøj under uddybning fra uddybningsfartøjer
Driftsfase	> Ophvirvling af sediment, spild og efterfølgende sedimentation > Frigivelse af næringsstoffer > Frigivelse af miljøfarlige forurenende stoffer > Undervandsstøj under løbende oprensning fra uddybningsfartøjer > Permanente ændringer af lokale strømforhold

B.3 Deskriptorerne i Havstrategien

I det følgende vurderes deskriptorerne i forhold til påvirkningen fra projektområdet for uddybning af Sælhundeholm Løb for hhv. anlægs- og driftsfasen.

Det noteres, at deskriptorerne D1, D4 og D6 er såkaldte tilstandsdeskriptorer, der er forbundet med tilstanden af relevante økosystemelementer i havmiljøet, hvorimod deskriptorerne D2, D3 og D5-D11 er påvirkningsdeskriptorer, der er knyttet til de relevante menneskeskabte belastninger og påvirkninger af havmiljøet.

Der foretages en indledende vurdering af planens potentielle påvirkninger og disses relevans for de enkelte deskriptorer med henblik på at udpege de deskriptorer, der skal analyseres nærmere (Tabel B-2).

Tabel B-2 Tabellen viser havstrategidirektivets 11 deskriptorer og det redegøres for, hvordan projektet påvirker de enkelte deskriptorer.

De- skriptor	Beskrivelse af deskriptor	Relevans for projektområdet for uddybning af delom- råde S6 i sejlrende ved Thyborøn
D1	Biodiversiteten er opretholdt. Kvaliteten og forekomsten af habitater samt udbredelsen og tætheden af arter svarer til de fremherskende fysiske, geografiske og klimatiske forhold.	Biodiversiteten kan potentielt blive påvirket af undervandsstøj, sedimentspild og sedimentspredning samt tab af nuværende habitater. Der er opsat miljømål for fugle, fisk, havpattedyr og pelagiske habitater (plankton). Fugle samt sæler og marsvin forventes at være omfattet af det nærliggende Natura 2000-område indsatsplaner. Men grundet anlægsområdets placering i relativ tæthed til Natura 2000-område N28, som inkluderer et habitatområde og flere fuglebeskyttelsesområder vil der fokuseres på potentielle påvirkninger på fugle, fisk, sæler og marsvin i Natura 2000-væsentlighedsvurderingen i afsnit 5. En potentiel frigivelse af næringsstoffer grundet sediment-spild og -spredning vil være omfattet af vandrammedirektivet, som implementeres i vandområdeplanerne 2021-2027. Vurdering af vandområdeplanerne og de dertilhørende kvalitetselementer ses i Appendix A. I havstrategidirektivet er der overlap med vandrammedirektivets biologiske kvalitetselementer, herunder fytoplankton, anden akvatisk flora og den benthiske invertebratfauna. På baggrund af ovenstående vurderes deskriptoren relevant for anlægs- og driftsfasen af uddybningen og oprensningen af delområde S6 i Sælhundeholm Løb.
D2	Ikke-hjemmehørende arter indført ved menneskelige aktiviteter ligger på niveauet, der ikke ændrer økosystemerne i negativ retning.	Ikke-hjemmehørende arter kan potentielt introduceres ved skibsfart, via udledning af ballastvand og/eller skibsbegroning. Ikke-hjemmehørende arter forventes ikke at blive introduceret, ved anlægsfasen hvor uddybningen finder sted. Skibstrafikken vil potentielt blive øget i en periode under anlægsfasen, men størstedelen vil sandsynligvis være fartøjer fra hjemlige farvande, hvorved en risiko for introduktion af marine ikke-hjemmehørende arter er ubetydelig. Skibe involveret i international skibsfart forventes senest inden september 2024 at skulle behandle deres ballastvand inden udledning (D2 standard) iht. reglerne i ballastvandskonventionen. Indtil da er der en overgangsordning, hvor skibene skal udskifte deres ballastvand (D1 standard). Samtidigt forventes skibene at overholde de retningslinjer, der er udstukket af IMO i forhold til skibsbegroning. Grundet den forventede lave stigning i antallet af internationale skibe samt foranstaltninger i henhold til ballastvandskonventionen og IMOs retningslinjer for skibsbegroning, anses risikoen for introduktion af ikke-hjemmehørende arter at være ubetydelig. På baggrund af ovenstående forventes deskriptoren ikke at være relevant for denne vurdering af uddybning og oprensning af delområde S6 i Sælhundeholm Løb.

De-skriptor	Beskrivelse af deskriptor	Relevans for projektområdet for uddybning af delområde S6 i sejltrede ved Thyborøn
D3	Populationerne af alle fiske- og skaldyrarter, der udnyttes erhvervsmæssigt, ligger inden for sikre biologiske grænser og udviser en alders- og størrelsesfordeling, der er betegnende for en sund bestand.	Projektet forventes ikke at påvirke fiske- og skaldyrarter, der udnyttes erhvervsmæssigt. Deskriptor 3 fokuserer på potentielle påvirkninger på fisk og skaldyr, der udnyttes kommercielt og særligt påvirkninger fra fiskerierhvervet. På baggrund af ovenstående forventes deskriptoren ikke at være relevant for denne vurdering af uddybning og oprensning af delområde S6 i Sælhundeholm Løb.
D4	Alle elementer i havets fødenet, i den udstrækning der er kendt, er til stede og forekommer med normal tæthed og diversitet og på niveauet, som er i stand til at sikre en langvarig artstæthed og opretholdelse af arternes fulde reproduktions-evne.	Elementer i havets fødenet kan potentielt blive påvirket af frigivelse af sediment med miljøfarlige forurenede stoffer og næringsstoffer samt permanent tab af habitattyper. En potentiel påvirkning af undervandsstøj vurderes specifikt under deskriptor 11. De opsatte miljømål omfatter forpligtelser for Miljøministeriet til at bidrage til det regionale arbejde vedrørende fastsættelse af tærskelværdier, bidrage til regional videns- og metodeudvikling samt at følge udviklingen i fødenettet igennem overvågning. Projektet vil ikke påvirke nogle af disse miljømål. På baggrund af ovenstående forventes deskriptoren at være relevant for anlægs- og driftsfasen af uddybningen og oprensningen af delområde S6 i Sælhundeholm Løb.
D5	Menneskeskabt eutrofiering er minimeret, navnlig de negative virkninger heraf, såsom tab af biodiversitet, forringelse af økosystemet, skadelige algeforekomster og iltmangel på havbunden.	Sedimentspild -og spredning kan potentielt forårsage en frigivelse og spredning af næringsstoffer. En potentiel frigivelse og spredning af næringsstoffer vil være omfattet af vandrammedirektivet. En potentiel eutrofiering håndteres således af vandområdeplanerne ved biologiske kvalitetselementer og generelle fysisk-kemiske elementer (se Appendix A). Miljømålene omfatter fastsættelse af tærskelværdier og overholdelse af forpligtelserne i vandområdeplanerne. Der vil ske en særskilt vurdering i henhold til vandområdeplanerne i Appendix A. På baggrund af ovenstående forventes deskriptoren at være relevant for anlægs- og driftsfasen af uddybningen og oprensningen af delområde S6 i Sælhundeholm Løb.
D6	Havbundens integritet er på et niveau, der sikrer, at økosystemernes struktur og funktioner bevares, og at især benthiske økosystemer ikke påvirkes negativt.	Tab af havbund, sedimentspild -og spredning vil forårsage en fysisk forstyrrelse af havbunden. Uddybning i Sælhundeholm Løb vil forårsage et fysisk tab af havbunden samt give anledning til sedimentspredning og potentielt sedimentspild. På baggrund af ovenstående forventes deskriptoren at være relevant for anlægs- og driftsfasen af uddybningen og oprensningen af delområde S6 i Sælhundeholm Løb.

De- skriptor	Beskrivelse af deskriptor	Relevans for projektområdet for uddybning af delom- råde S6 i sejlrende ved Thyborøn
D7	Permanent ændring af de hydrografiske egenskaber påvirker ikke de marine økosystemer i negativ retning.	Projektet kan potentielt påvirke hydrografien i området mellem Agger Tange og Thyborøn ved uddybningsarbejdet. På baggrund af ovenstående forventes deskriptoren at være relevant for anlægs- og driftsfasen af uddybningen og oprensningen af delområde S6 i Sælhundeholm Løb.
D8	Koncentrationer af forurenende stoffer ligger på niveauet, der ikke medfører forureningsvirkninger.	Projektet forventes potentielt at frigive miljøfarlige forurenende stoffer grundet frigivelse af stofferne ved uddybning og oprensning i delområde S6 i sejlrenden. En potentiel håndtering af miljøfarlige forurenende stoffer håndteres af vandområdeplanerne i det omfang, der er tale om specifikke stoffer (nationale specifikke stoffer samt EU-prioriterede stoffer. Dette vil således være omfattet af vandområdeplanerne (se Appendix A). Deskriptoren vurderes at være relevant for havstrategivurderingen af anlægs- og driftsfasen af uddybningen og oprensningen af delområde S6 i Sælhundeholm Løb.
D9	Forurenende stoffer i fisk og skaldyr til konsum overstiger ikke de niveauet, der er fastlagt i fællesskabslovgivningen eller andre relevante standarder.	Projektet forventes potentielt at frigive miljøfarlige forurenende stoffer grundet frigivelse af stofferne ved uddybning og oprensning i delområde S6 i sejlrenden. Dog forekommer der ikke kommercielt fiskeri i området ved indsejlingen til Limfjorden. En potentiel håndtering af miljøfarlige forurenende stoffer håndteres af vandområdeplanerne i det omfang, der er tale om specifikke stoffer (nationale specifikke stoffer samt EU-prioriterede stoffer. Dette vil således være omfattet af vandområdeplanerne (se Appendix A). På baggrund af ovenstående vurderes deskriptoren ikke at være relevant for havstrategivurderingen af anlægs- og driftsfasen af uddybningen og oprensningen af delområde S6 i Sælhundeholm Løb.
D10	Egenskaberne ved og mængderne af affald i havet skader ikke kyst- og havmiljøet.	Projektets aktiviteter forventes ikke at bidrage med marint affald i større omfang. Alle skibe vil overholde reglerne i MARPOL, som er implementeret i havmiljøloven (LBK 1165 af 25/11/2019), hvilket betyder, at udtømning af affald på dansk søterritorium ikke er tilladt. Deskriptoren vurderes ikke at være relevant for havstrategivurderingen af anlægs- og driftsfasen af uddybningen og oprensningen af delområde S6 i Sælhundeholm Løb.
D11	Indførelsen af energi, herunder undervandsstøj, befinder sig på et niveau, der ikke påvirker havmiljøet i negativ retning.	Der vil under anlægsfasen ske en forøgelse af undervandsstøj grundet støjudsendelse af uddybningsfartøjer i sejlrenden. I driftsfasen forventes der ikke at ske en forøgelse af undervandsstøjen ifm. oprensning af sejlrenden, når der vurderes et behov for det, da det er vurderet at der ikke sker en øget sedimentation i sejlrenden pga. af uddybningen. På baggrund af ovenstående forventes deskriptoren at være relevant for anlægs- og driftsfasen af uddybningen og oprensningen af delområde S6 i Sælhundeholm Løb.

B.4 Opsummering af relevante deskriptorer ift. uddybningen jf. Havstrategidirektivet

På baggrund af ovenstående screening i Tabel B-2 vil nedenstående deskriptorer blive vurderet i detaljer for denne vurdering (Tabel B-3).

Tabel B-3 Oversigt over deskriptorer der vurderes at være relevant i forhold til havstrategidirektivet.

	Deskriptor
Anlægs -og driftsfase	> D1 Biodiversitet > D4 Havets fødenet > D5 Eutrofiering > D6 Havbundens integritet > D7 Hydrografiske ændringer > D8 Forurenende stoffer > D11 Undervandsstøj

Danmark har en pligt til for hver deskriptor at fastsætte miljømål med dertil hørende indikatorer for opnåelsen af god miljøtilstand for de danske havområder (LBK 1161 §8). Miljømål fastsættes med det formål at arbejde hen imod at opnå god miljøtilstand for hver enkelt deskriptor. Disse miljømål er bindende for myndighederne i Danmark, dvs. at der ikke må gives tilladelser til projekter, der er i strid med de fastsatte miljømål og dermed opnåelse af god miljøtilstand (LBK §18). Vurderingen af projektområdet af uddybningens og oprensningens potentielle påvirkninger på de relevante deskriptorer tager derfor blandt andet udgangspunkt i de fastsatte miljømål, som fremgår af "Danmarks Havstrategi II. Første del. God miljøtilstand. Basisanalyse. Miljømål" samt "Danmarks Havstrategi II. Tredje del. Indsatsprogram" (Miljø og Fødevareministeriet, 2019; Miljøministeriet, 2023).

B.5 Påvirkning af relevante deskriptorer i anlægs- og driftsfase af uddybningen

B.5.1 D1 Biodiversitet

Vurderingen af biodiversiteten i de danske marine områder fokuserer på følgende dyregrupper: fugle, havpattedyr, fisk og pelagiske habitater (plankton). Formålet med deskriptor 1 er at sikre, at biodiversiteten opretholdes. Der er endnu ikke fastlagt tærskelværdier for god miljøtilstand for pelagiske habitater og fisk, der ikke udnyttes erhvervsmæssigt.

Det vurderes nedenfor, at anlægsfasen og driftsfasen af uddybning og oprensning af delområde S6 i sejlrenden ikke påvirker miljømålene for deskriptor 1 Biodiversitet i Tabel B-4.

Tabel B-4 Miljømål for deskriptor 1 Biodiversitet ifølge den danske havstrategi II samt vurdering af projektets påvirkning på miljømålet.

	Miljømål	Påvirkning fra projektet i anlægsfasen	Påvirkning fra projektet i driftsfasen	Kommentarer
Fugle	1.1 Utsigtet bifangst af fugle ligger på et niveau, som ikke truer arten på lang sigt.	Ingen påvirkning	Ingen påvirkning	Projektet deltager ikke i aktiviteter, der har bifangst af fugle.
	1.2 Fugle sikres bestande og levesteder opretholdt og beskyttet i henhold til målsætninger under fuglebeskyttelsesdirektivet.	Ingen påvirkning	Ingen påvirkning	Potentielle påvirkninger på fugle på udpegningsgrundlagene for de relevante Natura 2000-områder vurderes i Natura 2000-væsentlighedsvurdering i afsnit 5.
	1.3 Miljø- og Fødevareministeriet bidrager til det regionale arbejde vedrørende fastsættelse af tærskelværdier og god miljøtilstand og arbejder for, at tilstanden for biodiversitet er i overensstemmelse hermed.	Ikke relevant	Ikke relevant	Projektet er ikke involveret i arbejdet omkring fastsættelse af tærskelværdier.
	1.4 Øget viden om bifangst af havfugle indsamles i medfør af de relevante overvågningsprogrammer	Ikke relevant	Ikke relevant	Projektet er ikke involveret i aktiviteter, der forårsager bifangst af fugle.
	1.5 Behov for beskyttelsestiltag for HELCOM og OSPAR rødlistede arter vurderes. Findes der rødlistede arter, som er truede eller ikke tilstrækkeligt beskyttede, vil Miljø- og Fødevareministeriet konkret vurdere behov for og evt. gennemføre yderligere tiltag i samarbejde med relevante ministerier	Ikke relevant	Ikke relevant	Projektet er ikke involveret i vurderingen af om fugle har behov for yderligere beskyttelse.
Havpattedyr	1.6 Utsigtet bifangst af marsvin reduceres mest muligt og som minimum til et niveau under 1,7 % af den samlede bestands størrelse.	Ikke relevant	Ikke relevant	Projektet har ingen bifangst af marsvin.

Miljømål	Påvirkning fra projektet i anlægsfasen	Påvirkning fra projektet i driftsfasen	Kommentarer
1.7 Utsigtet bifangst af sæler ligger på et tilstrækkeligt lavt niveau, som ikke truer bestande af sæler på lang sigt.	Ikke relevant	Ikke relevant	Projektet har ingen bifangst af sæler.
1.8 Marsvin, spættet sæl og gråsæl opnår gunstig bevaringsstatus i overensstemmelse med den tidshorisont, der er fastsat under habitatdirektivet.	En potentiel påvirkning under uddybning af sejlrende ved Thyborøn vil være kortvarig og vil ikke have indflydelse på bestandsniveau eller fødegrundlag for marsvin, spættet sæl eller gråsæl.	Der forventes ikke påvirkning på bestandsniveau eller fødegrundlag for marsvin, spættet sæl eller gråsæl i driftsfasen.	Påvirkning af marsvin fra undervandsstøj under etablering er beskrevet i Natura 2000-vurderingen afsnit 5 og i Appendix C om Bilag IV-arter.
1.9 Miljø- og Fødevareministeriet bidrager til at fastsætte bestandsspecifikke tærskelværdier for bifangst af marsvin i regionalt regi med henblik på efterfølgende fastsættelse af miljømål for sårbare bestande af marsvin	Ingen påvirkning	Ingen påvirkning	Projektet er ikke involveret i arbejdet omkring fastsættelse af tærskelværdier.
1.10 Øget viden om bifangst af havpattedyr indsamles i medfør af de relevante overvågningsprogrammer	Ingen påvirkning	Ingen påvirkning	Projektet er ikke involveret i overvågning af havpattedyr.
1.5 Behov for beskyttelsestiltag for HELCOM og OSPAR rødlistede arter vurderes. Findes der rødlistede arter, som er truede eller ikke tilstrækkeligt beskyttede, vil Miljø- og Fødevareministeriet konkret vurdere behov for og evt. gennemføre yderligere tiltag i samarbejde med relevante ministerier	Information om bestanden af marsvin, spættet sæl og gråsæl i projektområdet dækket af den danske havstrategi II overvågningsprogram.	Information om bestanden af marsvin, spættet sæl og gråsæl i projektområdet dækket af den danske havstrategi II overvågningsprogram.	Projektet er ikke involveret i vurderingen af om pattedyr har behov for yderligere beskyttelse.

	Miljømål	Påvirkning fra projektet i anlægsfasen	Påvirkning fra projektet i driftsfasen	Kommentarer
Fisk	1.11 Miljø- og Fødevareministeriet gennemfører en analyse af bifangsten af hajer og rokker i danske havområder, og muligheden for en DNA-baseret tilgang til artsbestemmelse undersøges.	Ikke relevant	Ikke relevant	Projektet er ikke involveret i analyse af bifangsten af hajer og rokker.
	1.12 Miljø- og Fødevareministeriet udvikler en national indikator til bedømmelse af tilstanden for danske kystfisk, der ikke udnyttes erhvervsmæssigt, og mulighederne for at videreudvikle regionale indikatorer undersøges	Ikke relevant	Ikke relevant	Projektet er ikke involveret i arbejdet omkring udvikling af indikatorer.
	1.3 Miljø- og Fødevareministeriet bidrager til det regionale arbejde vedrørende fastsættelse af tærskelværdier og god miljøtilstand og arbejder for, at tilstanden for biodiversitet er i overensstemmelse hermed.	Ikke relevant	Ikke relevant	Projektet er ikke involveret i arbejdet omkring fastsættelse af tærskelværdier.
Pelagiske habitater	1.13 Forekomsten af plankton følger langtidsgennemsnittet	Der er potentiel påvirkning fra sedimentspild -og spredning på pelagiske habitater.	Der forventes ingen påvirkninger på pelagiske habitater i driftsfasen.	Sedimentspild - og spredning vurderes kun at bevirke kortvarige og lokale påvirkninger i anlægsfasen og endnu mere kortvarige og lokale bivirkninger i driftsfasen grundet den yderligere ekstra oprensningsmængde på 10.000 m ³ (COWI, 2024).
	1.14 Miljø- og Fødevareministeriet følger udviklingen og forbedrer vidensgrundlaget om plankton gennem overvågning	Ikke relevant	Ikke relevant	Projektet er ikke involveret i overvågning af plankton.

Miljømål	Påvirkning fra projektet i anlægsfasen	Påvirkning fra projektet i driftsfasen	Kommentarer
1.3 Miljø- og Fødevarerministeriet bidrager til det regionale arbejde vedrørende fastsættelse af tærskelværdier og god miljøtilstand og arbejder for, at tilstanden for biodiversitet er i overensstemmelse hermed.	Ikke relevant	Ikke relevant	Projektet er ikke involveret i arbejdet omkring fastsættelse af tærskelværdier.

B.5.2 D4 Havets fødenet

Havstrategiens miljømål for havets fødenet omhandler sikring af fornøden viden for fremadrettet at kunne fastsætte tærskelværdier for fødenettets tilstand.

Det vurderes nedenfor, at anlægsfasen og driftsfasen af uddybning og oprensning af delområde S6 i sejlrenden ikke påvirker miljømålene for deskriptor 4 Havets fødenet (Tabel B-5).

Tabel B-5 Miljømål for deskriptor 4 Havets fødenet ifølge den danske havstrategi II samt vurdering af projektets påvirkning på miljømålet.

	Miljømål	Påvirkning fra projektet i anlægsfasen	Påvirkning fra projektet i driftsfasen	Kommentarer
Havets fødenet	4.1 Miljø- og Fødevarerministeriet bidrager til det regionale arbejde vedrørende fastsættelse af tærskelværdier og god miljøtilstand og arbejder for, at de menneskeskabte påvirkninger af fødenettet og dets delelementer er i overensstemmelse hermed.	Ikke relevant	Ikke relevant	Projektet er ikke involveret i arbejdet omkring fastsættelse af tærskelværdier.
	4.2 Miljø- og Fødevarerministeriet bidrager til regional videns- og metodeudvikling vedrørende havets fødenet.	Ikke relevant	Ikke relevant	Projektet er ikke involveret i regional videns- og metodeudvikling.

Miljømål	Påvirkning fra projektet i anlægsfasen	Påvirkning fra projektet i driftsfasen	Kommentarer
4.3 Miljø- og Fødevareministeriet følger udviklingen i fødenettet igennem overvågning af fødenettets enkelte delelementer	Ikke relevant	Ikke relevant	Projektet er ikke involveret i overvågning.

B.5.3 D5 Eutrofiering

Havstrategiens miljømål omhandler menneskeskabt eutrofiering og om at undgå en øget koncentration af næringsstofferne kvælstof og fosfor i havmiljøet. Øget algevækst kan føre til iltsvind og dårlige lysforhold i vandet og dermed forringe forholdene for bundplanter, fisk og andre dyr. Endvidere kan det medvirke til opblomstring af giftige alger.

Kvælstofindsatser er beskrevet i henhold vandområdeplanerne 2021-2027 i Appendix A. Der er et indsatsbehov i vandområdet 232 Nisum Bredning, som også overlapper med uddybningsområdet jf. (Miljøministeriet, 2023). Her konkluderes det, at projektet kan hindre målopfyldelse i vandområde 232 Nisum Bredning, hvis kvælstofniveauet ikke reduceres på anden vis.

Det vurderes nedenfor, at uddybning og oprensning af delområde S6 i sejlrenden ikke påvirker miljømålene for Deskriptor 5 Eutrofiering (se nedenstående Tabel B-6) på nær kvælstofindsatserne, som håndteres i Appendix A.

Tabel B-6 Miljømål for deskriptor 5 Eutrofiering ifølge den danske havstrategi II samt vurdering af projektets påvirkning på miljømålet.

	Miljømål	Påvirkning fra projektet i anlægsfasen	Påvirkning fra projektet i driftsfasen	Kommentarer
Eutrofiering	5.1 Miljø- og Fødevareministeriet bidrager til det regionale arbejde vedrørende fastsættelse af tærskelværdier og god miljøtilstand for Nordsøen og Skagerrak og arbejder for, at menneskeskabt eutrofiering og effekterne heraf er i overensstemmelse hermed.	Ikke relevant	Ikke relevant	Projektet er ikke involveret i arbejdet omkring fastsættelse af tærskelværdier.

Miljømål	Påvirkning fra projektet i anlægsfasen	Påvirkning fra projektet i driftsfasen	Kommentarer
5.2 Dansk andel af tilførsler af kvælstof og fosfor (TN, TP) følger de maksimalt acceptable tilførsler fastsat i HELCOM.	Ikke relevant	Ikke relevant	Projektet påvirker ikke Bælthavet, Kattegat og den centrale del af Østersøen hvori der i HELCOM-regi er fastsat maksimalt acceptable TN- og TP-tilførsler.
5.3 Kystvande: Målb belastninger og indsatsbehov for fjorde og kystvande fastsat i henhold til vandrammedirektivet overholdes. Mål og behov fremgår af de danske vandområdeplaner.	Uddybningen kan medføre ophvirvling af sediment og frigivelse af næringsstoffer.	Der forventes en meget lille påvirkning ved oprensning af delområde S6 og dermed frigivelse af næringsstoffer i driftsfasen, eftersom oprensningsmængden kun øges med yderligere 10.000 m ³ sediment (se vurdering i Appendix A).	Vurdering af potentielt kvælstof og fosfor påvirkning på vandområderne vurderes i Appendix A. Her konkluderes det, at den mængde næringsstof, der frigives ved uddybningen og oprensningen, ikke vil hindre mål opfyldelse af vandområde 133 Vesterhavet, nord, mens projektet kan hindre mål opfyldelse i vandområde 232 Nissum Bredning, hvis kvælstofniveauet ikke reduceres på anden vis.

B.5.4 D6 Havbundens integritet

Havbundens integritet vurderes dels ud fra påvirkninger (tab og fysisk forstyrrelse) og tilstand (habitattyper på havbunden). Havstrategiens miljømål for havbundens integritet omhandler bl.a. opbygning af viden og bidrag til fastsættelse af tærskelværdier for tab og forstyrrelse.

Uddybning af havbund anses som værende en fysisk forstyrrelse. Ved aktiviteter, der medfører en forstyrrelse af havbunden, kan forstyrrelserne genoprettes, hvis aktiviteten ophører. Omfanget af forstyrrelsen vil blive indrapporteret til Miljøstyrelsen.

Det vurderes, at uddybning og oprensning af delområde S6 i sejlrenden ikke påvirker miljømålene for Deskriptor 6 Havbundens integritet, se nedenstående Tabel B-7.

Tabel B-7 Miljømål for Deskriptor 6 Havbundens integritet ifølge den danske havstrategi II samt vurdering af projektets påvirkning på miljømålet.

	Miljømål	Påvirkning fra projektet i anlægsfasen	Påvirkning fra projektet i driftsfasen	Kommentarer
Havbundens integritet (tab og fysiske påvirkninger)	6.1 Miljø- og Fødevarerministeriet bidrager til arbejdet regionalt og i EU vedrørende fastsættelse af tærskelværdier og god miljøtilstand og arbejder for, at tab, fysisk forstyrrelse og negative effekter på havbunden er i overensstemmelse hermed.	Der vil være tale om en begrænset forstyrrelse på havbunden i Sælhundeholm Løb ved det midlertidige uddybningsarbejde.	I driftsfasen vil der være tale om fysiske ændringer på baggrund af uddybning som forårsager permanent habitattab samt ved efterfølgende oprensninger.	Der henvises til afsnit 5 for yderligere vurdering af de fysiske påvirkninger.
	6.2 Vidensgrundlaget om den danske havbund, udbredelsen og beliggenheden af havbundens naturtyper og deres tilstand forbedres i forbindelse med overvågningsprogrammet (NOVANA).	Ikke relevant	Ikke relevant	Projektet er ikke involveret i NOVANA-overvågning.
	6.3 Gennem arbejdet regionalt og i EU skabes bedre forståelse af påvirkninger på havbunden i forhold til tab, forstyrrelse og negativ påvirkning.	Ikke relevant	Ikke relevant	Projektet er ikke involveret i regionalt eller EU arbejde vedrørende påvirkninger på havbunden.
	6.4 I forbindelse med tilladelse til aktiviteter på havet, der kræver en miljøkonsekvensvurdering, fremmer godkendelsesmyndigheden, at udstrækningen af fysisk tab og fysisk forstyrrelse af havbundens overordnede habitattyper vurderes og indrapporeres til Miljøstyrelsen (overvågningsprogram).	Der indrapporeres til Miljøstyrelsen, såfremt myndigheden kræver dette.	Der indrapporeres til Miljøstyrelsen, såfremt myndigheden kræver dette.	
Havbundens integritet (Habitattyper på havbunden)	6.5 Habitatdirektivets marine naturtyper opnår gunstig bevaringsstatus i overensstemmelse med den tidshorisont, der er fastsat af habitatdirektivet.	Projektet forventer ikke at påvirke havbundens integritet for de marine naturtyper.	Projektet forventer ikke at påvirke havbundens integritet for de marine naturtyper.	Potentielle påvirkninger er vurderet i Natura 2000-væsentlighedsvurdering i afsnit 5.

Miljømål	Påvirkning fra projektet i anlægsfasen	Påvirkning fra projektet i driftsfasen	Kommentarer
6.6 Det nordlige Øresund udpeges som beskyttet område under havstrategidirektivet, og der gennemføres et stop for tilladelser til indvin- ding af råstoffer. Dette medfører ikke ændringer i forhold til den eksisterende fi- skeriregulering.	Ikke relevant	Ikke relevant	Projektet er ikke involveret i arbejdet med at udpege Øresund som be- skyttet område under havstra- tegidirektivet.
6.7 De væsentlige habitater indeholder de for danske hav- områder almindeligt forekommende arter og samfund.	Projektet vil potentielt i et mindre område midlertidigt ændre sam- mensætning af bundfaunaen. Påvirkningen vurderes dog til at være mid- lertidig og lo- kal.	Projektet for- ventes ikke un- der drift at på- virke sammen- sætningen af de almindeligt forekommende arter og sam- fund.	
6.8 Når tærskelvær- dier for tab, forstyr- relse og negative på- virkninger er fastsat i EU og de regionale havkonventioner, vil Miljø- og Fødevare- ministeriet igang- sætte et projekt, som kan danne grundlag for at fastsætte mil- jømål i overensstem- melse med tærskel- værdierne og god miljøtilstand.	Ikke relevant	Ikke relevant	Projektet er ikke involveret i arbejdet om- kring fastsæt- telse af tær- skelværdier.
6.9 Behov for beskyt- telsestiltag for HELCOM og OSPAR rødlistede naturtyper vurderes. Findes der rødlistede naturtyper, som er truede eller ikke tilstrækkeligt beskyttede, vil Miljø- og Fødevareministe- riet konkret vurdere behov for og evt. gennemføre yderli- gere tiltag i samar- bejde med relevante ministerier	Ikke relevant	Ikke relevant	Projektet er ikke involveret i vurderingen af rødlistede naturtyper.

Miljømål	Påvirkning fra projektet i anlægsfasen	Påvirkning fra projektet i driftsfasen	Kommentarer
6.10 Behovet for supplerende beskyttede områder eller andre tiltag i Østersøen og Nordsøen vurderes, og tilsvarende vurdering foretages for Bælthavet efterfølgende.	Ikke relevant	Ikke relevant	Projektet er ikke involveret i vurderingen af supplerende beskyttede områder i Østersøen eller Nordsøen.

B.5.5 D7 Hydrografiske ændringer

Havstrategiens deskriptor 7 omhandler de hydrografiske forhold i havet som fysiske egenskaber såsom temperatur, saltholdighed, havstrømme og bølgepåvirkning. Disse naturlige forhold er af afgørende betydning for de marine økosystemer. De hydrografiske forhold er i høj grad bestemt af vind, tidevand, lufttryk og ikke mindst klima, men kan også påvirkes af mange forskellige typer af menneskelige aktiviteter, herunder anlæg som havvindmølleparker, offshore olie- og gasinstallationer, broer, havne mv. samt uddybning af sejlrender og anden påvirkning på havbunden.

Ændringer i de hydrografiske forhold kan påvirke de marine økosystemer og potentielt medføre varige ændringer i et økosystem. Deskriptoren omhandler permanente ændringer i de hydrografiske forhold med fokus på ændringer i vandsøjlen, ved havbunden og bentiske habitattyper.

Uddybning af Sælhundeholm Løb anses som værende en permanent forstyrrelse eftersom vanddybden påvirkes som følge af uddybning.

Det vurderes, at uddybning og oprensning af delområde S6 i sejlrenden ikke påvirker miljømålene for Deskriptor 7 Hydrografiske ændringer, se nedenstående Tabel B-8.

Tabel B-8 Miljømål for Deskriptor 7 Hydrografiske ændringer ifølge den danske havstrategi II samt vurdering af projektets påvirkning på miljømålet.

	Miljømål	Påvirkning fra projektet i anlægsfasen	Påvirkning fra projektet i driftsfasen	Kommentarer
Hydrografiske ændringer	7.1 Menneskeskabte aktiviteter, som især er forbundet med fysisk tab af havbunden, og som forårsager permanente hydrografiske ændringer: > har alene lokale påvirkninger på havbunden og i vandsøjlen og > udformes under hensyn til miljøet samt, hvad der er teknisk muligt og økonomisk rimeligt for at forebygge skadelige påvirkninger på havbunden og i vandsøjlen	Ingen påvirkning	Ingen påvirkning	Der forventes ikke betydelige hydrografiske ændringer ifm. uddybningen og oprensningen af delområde S6 i Sælhundeholm Løb, da der er tale om en relativt lille uddybningsmængde ift. at de hydrografiske forhold i indløbet til Limfjorden i forvejen er underlagt store dynamiske ændringer grundet åbningen mellem Agger Tange og Thyborøn.
	7.2 I forbindelse med tilladelse til aktiviteter på havet, der kræver en miljøkonsekvensvurdering, fremmer godkendelsesmyndigheden, at opgørelse over hydrografiske ændringer og de negative påvirkninger heraf indrapporteres til Miljøstyrelsen (overvågningsprogram)	Der indrapporteres til Miljøstyrelsen, såfremt myndigheden kræver det.	Der indrapporteres til Miljøstyrelsen, såfremt myndigheden kræver det.	

B.5.6 D8 Forurenende stoffer

Havstrategiens deskriptor 8 omhandler miljøfarlige forurenende stoffer, som er syntetiske og ikke-syntetiske forbindelser, der kan forårsage negative effekter på dyre- og planteliv og derigennem skabe uønskede ændringer i det naturlige miljø. Forurening af havmiljøet med miljøfarlige forurenende stoffer kan forårsage direkte negative biologiske effekter på marine organismer. Samtidig kan stofferne opkoncentrere sig igennem fødekæden og ende med at forårsage en særlig stor risiko for de marine rovdyr øverst i fødekæden som f.eks. sæler, havfugle og mennesker.

Miljømål 8.9, 8.10 og 8.11, der også hører under deskriptor 8, omhandler olie (f.eks. råolie, diesel og hydraulikolier) og en række andre kemikalier, der er relevante i forhold til vurdering af akutte forureningshændelser i medfør af havstrategidirektivet. Projektet vil ikke give anledning til udledning af olie og andre kemikalier i forhold til vurdering af akutte forureningshændelser, hvorfor der ikke foretages yderligere vurdering af disse miljømål.

Det vurderes nedenfor, at uddybning og oprensning af delområde S6 i sejlrenden ikke påvirker miljømålene 8.2-8.4 i den danske havstrategi for Deskriptor 8 Forurenende stoffer (se nedenstående Tabel B-9). På nuværende tidspunkt, skal det bemærkes, at vurdering i forhold til miljømål 8.1 henvises der til vandområdeplanerne i Appendix A.

Tabel B-9 Miljømål for Deskriptor 8 Forurenende stoffer ifølge den danske havstrategi II samt vurdering af projektets påvirkning på miljømålet.

	Miljømål	Påvirkning fra projektet i anlægsfasen	Påvirkning fra projektet i driftsfasen	Kommentarer
Forurenende stoffer	8.1 Udledninger af forurenende stoffer i vand, sediment og levende organismer må ikke lede til overskridelser af vedtagne miljøkvalitetsstandarder, der anvendes i den gældende lovgivning (D8C1 og D8C2).	Ved uddybning i Sælhundeholm Løb vil der potentielt være frigivelse af miljøfarlige forurenende stoffer til vandsøjlen.	Ingen påvirkning	Sælhundeholm Løb er beliggende indenfor de ydre territorialfarvande, hvorfor Havstrategien henviser til vandområdeplanerne. Dette håndteres i Appendix A.
	8.2 Emissioner, udledninger og tab af PBDE og kviksølv standses eller udfases (D8C1).	Ved uddybning vil der potentielt være frigivelse af kviksølv til vandsøjlen. Se vurdering i Appendix A.	Ingen påvirkning	Sælhundeholm Løb er beliggende indenfor de ydre territorialfarvande, hvorfor Havstrategien henviser til vandområdeplanerne. Dette håndteres i Appendix A.
	8.3 Miljø- og Fødevarerministeriet bidrager til arbejdet regionalt og i EU vedrørende fastsættelse af tærskelværdier og god miljøtilstand og arbejder for, at mængderne af forurenende stoffer er i overensstemmelse hermed (D8C1).	Ikke relevant	Ikke relevant	Projektet er ikke involveret i arbejdet omkring fastsættelse af tærskelværdier.

Miljømål	Påvirkning fra projektet i anlægsfasen	Påvirkning fra projektet i driftsfasen	Kommentarer
8.4 Der sker et gradvist fald i niveauer af imposex/intersex hos havsnegle (D8C2).	Ikke relevant	Ikke relevant	Projektet giver ikke anledning til frigivelse af miljøfarlige forurenende stoffer i en grad der kan give anledning til gradvist fald i niveauer af imposex/intersex hos havsnegle.
8.9 Forekomst og omfang af akutte forureningsbegivenheder nedbringes løbende i muligt omfang gennem forebyggelse, overvågning og risikobaseret dimensionering af beredskabet (D8C3).	Ikke relevant	Ikke relevant	Projektet anses ikke som en akut forureningsbegivenhed.
8.10 De negative effekter på havpattedyr og -fugle, når der opstår væsentlige akutte forureningsbegivenheder, forebygges og minimeres i muligt omfang. Dette kan f.eks. sikres ved brug af flydepærre samt gennem beredskabsplaner for olieramte havpattedyr og -fugle (D8C4).	Ikke relevant	Ikke relevant	Projektet anses ikke som en akut forureningsbegivenhed.
8.11 Frem mod næste overvågningsprogram (2020) undersøger Miljøstyrelsen, hvordan negative effekter af væsentlige forureningsbegivenheder kan overvåges og registreres i de konkrete tilfælde (D8C4).	Ikke relevant	Ikke relevant	Projektet er ikke involveret i NOVANA-overvågningsprogrammet.

B.5.7 D11 Undervandsstøj

Havstrategiens miljømål om undervandsstøj omhandler undervandsstøj fra forskellige aktiviteter på havet. Havstrategien skelner mellem to støjindikatorer hhv. impulsstøj og lavfrekvent vedvarende støj. Den første omhandler aktiviteter, der forårsager impulsstøj, som f.eks. spunsnedramning. Den anden er lavfrekvent vedvarende støj, som primært stammer fra skibstrafik. For lavfrekvent

støj er der mål om fastsættelse af tærskelværdier og opbygning af viden. Der endnu ikke er fastsat kriterier for, hvordan dette skal måles.

Undervandsstøj fra uddybningsfartøjerne kan potentielt påvirke marine pattedyr og fisk. Emnet behandles under Natura 2000-væsentlighedsvurdering i afsnit 5.

Det vurderes nedenfor, at uddybning og oprensning i delområde S6 i sejlrenden ikke påvirker miljømålene for Deskriptor 11 Undervandsstøj (Tabel B-10).

Tabel B-10 Miljømål for Deskriptor 11 Undervandsstøj ifølge den danske havstrategi II samt vurdering af projektets påvirkning på miljømålet.

	Miljømål	Påvirkning fra projektet i anlægsfasen	Påvirkning fra projektet i driftsfasen	Kommentarer
Undervandsstøj	11.1 Havdyr under habitatdirektivet udsættes så vidt muligt ikke for impulslyde, der medfører permanente høreskader (PTS). Grænseværdien for PTS vurderes i øjeblikket at være 200 og 190 dB re.1 uPa2s SEL for hhv. sæler og marsvin, der er de arter, hvor der foreligger mest viden. Det må dog forventes, at disse grænser skal revideres, efterhånden som ny viden på området bliver tilgængelig. Værdierne er lydeksponeeringsniveauet akkumuleret over 2 timer.	Grænseværdier for midlertidige og permanente høreskader for marsvin og sæler vil i mindre områder omkring anlægsarbejdet med uddybning af Sælhundeholm Løb ikke blive overskredet. Ved uddybningen vil der potentielt udsendes lavfrekvent støj fra uddybningsfartøjerne.	Ingen påvirkning	Der forventes ingen udsendelse af impulsstøj i hverken anlægsfasen eller i driftsfasen. Der henvises til Natura 2000-væsentlighedsvurdering for vurdering af støj på havpattedyr.
	11.2 Menneskelige aktiviteter, som giver anledning til impulslyd, planlægges på en sådan måde, at direkte skadelige virkninger på sårbare populationer af havdyr i videst muligt omfang undgås både i rum, tid og niveau, og at påvirkningerne ikke vurderes at have langsigtede negative effekter på populationsniveau.	Ingen påvirkning	Ingen påvirkning	Der forventes ingen udsendelse af impulsstøj i anlægsfasen eller i driftsfasen.

Miljømål	Påvirkning fra projektet i anlægsfasen	Påvirkning fra projektet i driftsfasen	Kommentarer
11.3 Aktiviteter fra Forsvarsministeriets underliggende myndigheder, som medfører impulsstøj i havmiljøet, bliver så vidt muligt vurderet og tilpasset for at reducere en mulig negativ effekt på havdyr under habitatdirektivet, så længe dette ikke strider mod forsvarsformål eller den nationale sikkerhed. Forsvaret anvender gældende NATO-standarder, når der foretages miljøvurderinger.	Ikke relevant	Ikke relevant	Projektet deltagert ikke i aktiviteter fra Forsvarsministeriets underliggende myndigheder.
11.4 I forbindelse med udførelsen af seismiske forundersøgelser gennemføres tilstrækkelige afværgeforanstaltninger i overensstemmelse med Energistyrelsens vejledning om standardvilkår for forundersøgelser til havs.	Ingen påvirkning	Ingen påvirkning	Der foretages ikke seismiske undersøgelser i anlægsfasen eller i driftsfasen.
11.5 Miljø- og Fødevarerministeriet bidrager til arbejdet regionalt og i EU vedrørende fastsættelse af tærskelværdier og god miljøtilstand og arbejder for, at omfanget af undervandsstøj er i overensstemmelse hermed.	Ikke relevant	Ikke relevant	Projektet er ikke involveret i arbejdet omkring udvikling af tærskelværdier.
11.6 I forbindelse med tilladelse til aktiviteter på havet, der kræver en miljøkonsekvensvurdering, fremmer godkendelsesmyndigheden, at indregistreringer om impulsstøj indrapporteres til Miljøstyrelsen (overvågningsprogram).	Ingen påvirkning	Ingen påvirkning	Der udsendes ingen impulsstøj i anlægsfasen eller i driftsfasen.
11.7 Miljø- og Fødevarerministeriet vil gennemføre overvågning for bedre vidensniveauet om omfanget og niveauer af lavfrekvent støj i Østersøen og Nordsøen.	Ikke relevant	Ikke relevant	Projektet er ikke involveret i overvågning af lavfrekvent støj.

B.5.8 Havstrategiens indsatsprogram

Det skal sikres, at uddybning og oprensning af delområde S6 i Sælhundeholm Løb ikke påvirker havstrategiens indsatsprogram og overvågningsprogram. Det sidste indsatsprogram er fra 2023 (Miljøministeriet, 2023). Der er udarbejdet indsatser for hver enkelt deskriptor for at bidrage til opnåelse af de enkelte miljømål. Uddybning og oprensning af delområde S6 i sejlrenden påvirker ingen af disse indsatser.

B.5.9 Havstrategiens overvågningsprogram

Der henvises til afsnit A.3.3 for beskrivelse af NOVANA-overvågningsprogrammet.

B.5.10 Kumulative effekter

Vurdering af kumulative effekter ift. Havstrategien omfatter flere projekter i området omkring Sælhundeholm Løb. Der skal bl.a. foregå:

- > Kystfodring på den Jyske Vestkyst Agger og Harbøre Tanger (se yderligere beskrivelse og vurdering i afsnit 5)
- > Oprensning i sejlrenden til Thyborøn Agger færgeren (se yderligere beskrivelse og vurdering i afsnit 5)
- > Anlæggelsen af Thyborøn Havn etape 3 og 4 (se yderligere beskrivelse og vurdering i afsnit 5)
- > Det er en mængde på 142.000 m³, som skal uddybes for at opnå en vanddybde på -12,05 m DVR90 i S6. Hertil kommer en mængde på ca. 313.000 m³ sediment, der yderligere skal uddybes fra delområderne S1 til S5 (ansøgt hos Kystdirektoratet). Dette giver i alt en kumulativ uddybningsmængde på ca. 455.000 m³ (se yderligere vurdering i afsnit A.4.4.). Medtages oprensningsmængderne bliver den kumulative mængde for oprensning og uddybning derfor 595.000 m³.

Det forventes at miljømålene i Danmarks Havstrategi II kan opfyldes og at NOVANA-monitoringsstationerne ikke påvirkes ved gennemførelse af ovenstående projekter hvis projekterne forekommer samtidig med nærværende uddybning og oprensning af delområde S6 i Sælhundeholm Løb.

B.6 Samlet konklusion for vurdering af Havstrategien

Sammenfattende kan det konkluderes:

- > At anlægs -og driftsaktiviteter ifm. uddybning og oprensning af delområde S6 i Sælhundeholm Løb ikke vil forhindre, at miljømålene i Danmarks Havstrategi II kan opfyldes.

- > At NOVANA-monitoringsstationer ikke vil blive påvirket af uddybning og efterfølgende oprensning af delområde S6 i Sælhundeholm Løb.
- > At de to ovenstående konklusioner også gælder for de kumulative effekter.

Appendix C Bilag IV-arter

Af habitatdirektivet fremgår det, at medlemslandene skal indføre en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets artikel 12 og bilag IV, uanset om disse forekommer inden for eller uden for et Natura 2000-område. Disse dyrearter omtales i daglig tale som bilag IV-arter og dækker over en lang række forskellige dyr. I Danmark er f.eks. alle hvaler bilag IV-arter.

For dyrearter omfattet af bilag IV indebærer beskyttelsen et forbud mod:

- > Forsætligt indfangning eller drab
- > Forsætlig forstyrrelse, især når de yngler eller overvintrer
- > Beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder.
- > Opbevaring
- > Transport mm.

Yngleområder omfatter områder, som er nødvendige for dyrenes parring eller kurtisering, fødsel, eller opvækst af unger. Definitionen dækker også arealer i nærheden af selve yngleområdet, hvis afkommet er afhængigt af disse arealer.

Rasteområder defineres som områder, som er vigtige for at sikre overlevelsen af enkelte dyr eller bestande, når disse er i hvile. Rasteområder er således områder, hvor dyrene i eller uden for yngletiden opholder sig for at hvile, sove eller overvintrer, opholder sig i skjul i større koncentrationer eller opholder sig for at opfylde vigtige livsfunktioner.

For både yngle- og rasteområder gælder, at områder, der benyttes løbende hvert år eller med års mellemrum, skal beskyttes, selv når de ikke aktuelt benyttes af de pågældende arter.

Hvis et projekt har en påvirkning på én af de overstående punkter, kan der ikke meddeles tilladelse, medmindre strenge undtagelsesbetingelser er opfyldt. Det er desuden et krav, at vurderingen af projektets eventuelle påvirkning på bilag IV-arter fremgår af afgørelsen¹⁷.

Europa-Kommissionen har udarbejdet en vejledning¹⁸ til tolkningen af artikel 12-beskyttelsen og har introduceret muligheden for en mere fleksibel beskyttelse af

¹⁷ Bekendtgørelse nr. 1476 af 13. december 2010 om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg og elforsyningsnet på havet, jf. § 4 og 5.

¹⁸ Vejledning om streng beskyttelse af dyrearter af fællesskabsbetydning i henhold til habitatdirektivet, 2021

yngle- eller rasteområder baseret på princippet om en vedvarende økologisk funktionalitet (en bredere økologisk forståelse af yngle- og rasteområder).

Beskyttelsen indebærer, at yngle- eller rasteområder for bilag IV-dyrearter som udgangspunkt ikke må beskadiges eller ødelægges af aktiviteter, som der ansøges om eller planlægges for. Områder, der benyttes til fødesøgning, er kun omfattet af beskyttelsen, hvis de samtidigt bruges som yngle- eller rasteområde.

Overordnet set, skal det sikres, at den økologiske funktionalitet af den pågældende bestands yngle- og rasteområder, samlet set opretholdes på mindst samme niveau som hidtil. Økologisk funktionalitet skal vurderes ud fra en bred økologisk betragtning af det samlede leveområde for en population af en given art, snarere end for enkelte lokaliteter og delpopulationer.

Nærværende projekt er beliggende i den atlantiske marine region, hvor det er relevant at vurdere på følgende bilag IV-arter (Jakob Tougaard, 2021):

- > Marsvin
- > Hvidnæse
- > Øresvin
- > Vågehval


I de følgende afsnit vurderes det for de nævnte arter om uddybning og oprensning af sediment vil medføre:

- > Forsætligt drab og forstyrrelse
- > Beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder

C.1 Marsvin

C.1.1 Eksisterende forhold

Der er ikke udpeget yngleområder for marsvin i danske farvande. Det skyldes, at kælvning under vand meget sjældent observeres. Dog er de højeste forekomster af marsvin med kalve observeret langs den jyske vestkyst og i Bælthavet (Sveegaard, S., Nabe-Nielsen, J. & Teilmann, J., 2018). Yngleperioden falder i sommermånederne og efter en drægtighedsperiode på 10-11 måneder føder hunnen en kalv.



Figur C-1 SCANS-overvågning i Nordsøen i 2022. Kortet viser observationer og fordelingen af marsvin (*Phocoena phocoena*) angivet med rød (2022) (Gilles et al., 2023).

C.1.2 Vurdering af påvirkninger

Som udgangspunkt skal det sikres, at yngleområder ikke må påvirkes i en grad hvor marsvins økologiske funktionalitet svækkes. Den økologiske funktionalitet betyder, at yngle- og rasteområder skal bevares for at marsvin bestandens evne til at nå eller opretholde en levedygtig bestandstørrelse med potentialet til at nå og opretholde en gunstig bevarelsesstatus for hele arten. Der må således ikke ved menneskelig aktivitet ske en beskadigelse af yngle- eller rasteområder jævnfør artikel 12(1)(d) i habitatdirektivet.

Forsætligt drab og forstyrrelse af marsvin

Uddybning og oprensning er ikke af en sådan karakter, at det kan medføre drab på marsvin. Bilag IV-arter må ikke forsætlig forstyrres. Dette gælder i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler eller udviser yngelpleje. Forstyrrelser under yngleperioden (parring, kælvning og dieperiode) kan få indflydelse på marsvins ynglesucces og dermed også på deres bevaringsstatus. Mor-kalv parrene er særligt sårbare overfor støjpåvirkninger i den første tid efter kælvning, hvor kraftig forstyrrelse kan skræmme mor og kalv fra hinanden eller stresse moren, så moren ikke får nok føde og eventuelt ikke producerer nok mælk. Scenarier som disse nedsætter ungens sandsynlighed for at overleve den første vinter. Uddybning- og oprensningsaktiviteter omfatter maks. 24-28 døgn ved et uddybningsfartøj (COWI, 2024). Der vil ikke være tale om kraftige lydtryk, som kan medføre forsætlig forstyrrelse af marsvin. Da der er tale om en begrænset aktivitet, i et område med øvrig skibstrafik udelukkes det, at der vil ske en forsætlig forstyrrelse af marsvin som følge af projektet.

Beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder


Uddybning og oprensning i delområde S6 i Sælhundeholm Løb er ikke af sådan en karakter, at det vil beskadige eller ødelægge yngleområder, hvilket derfor udelukkes. Det vurderes på den baggrund at den økologiske funktionalitet oprettholdes for arten.

C.2 Hvidnæse

C.2.1 Eksisterende forhold

Hvidnæse (*Lagenorhynchus albirostris*) er, efter marsvin, den mest almindelige hvalart i Danmark. Hvidnæsen lever i den arktiske og tempererede dele af Nordatlanten og observeres tit omkring kontinentalskråningen, hvor der er en stor koncentration af fødeemner (Kinze C. C., 2022). I danske farvande er hvidnæsen mest almindelig i den nordlige Nordsø og Skagerrak (formentlig omkring Norske Rende), hvorfra der jævnligt sker indvandring til de indre danske farvande inklusiv indre Kattegat og lejlighedsvis ind i Østersøen (DCE, 2008). Hvidnæsen ynglebiologi er ikke godt beskrevet, men det formodes at dyrene, i den danske del af Nordsøen, tilhører samme ynglebestand som ved Skotland (Baagøe & Jensen, 2007).

I Nordsøen er bestanden optalt ifm. SCANS-undersøgelser i 1994, 2005, 2016 og 2022 (Hammond, et al., 2017) (Gilles et al., 2023)). Optællingerne viser, at der er en stabil samlet forekomst i Nordsøen på over 20.000 individer. Der forefindes ikke et decideret udbredelseskort for hvidnæse i forundersøgelsesområdet, men kort over observationer og overvågningsindsatser viser, at de hyppigst forekommer i den nord-nordvestlige del af Nordsøen og mindre hyppigt i de indre danske farvande inklusive Kattegat (Figur C-2).



Figur C-2 SCANS-overvågning i Nordsøen i 2022. Kortet viser observationer og fordelingen af hhv. hvidnæse (White-beaked dolphin) angivet med blå, mens hvidskævn (white-sided dolphin) er angivet med rød (2022) (Gilles et al., 2023).

Ifølge Atlas over danske pattedyr har der i perioden 1984-2003 været hyppige observationer af hvidnæser på tværs af Kattegat (Baagøe & Jensen, 2007) og det blev i 2024 fastslået at arten må antages at benytte danske farvande som yngleområde. Ligeledes er der i flere tilfælde fundet nyfødte kalve ved danske strande, hvilket indikerer yngleaktivitet i danske farvande. For nyligt er der fundet evidens for yngleaktiviteten baseret på litteraturgennemgang af litteraturen med tidlige obduktioner af hvidnæser blev der fundet flere individer med fostre i Kattegat og Bælthavet, hvorfor arten må antages at benytte dansk farvand som yngleområde (Alstrup et al., 2024).

C.2.2 Vurdering af påvirkninger

Som udgangspunkt skal det sikres, at yngleområder ikke må påvirkes i en grad hvor hvidnæsers økologiske funktionalitet svækkes. Den økologiske funktionalitet betyder, at yngle- og rasteområder skal bevares for at hvidnæsebestandens evne til at nå eller opretholde en levedygtig bestandstørrelse med potentialet til at nå og opretholde en gunstig bevarelsesstatus for hele arten. Der må således ikke ved menneskelig aktivitet ske en beskadigelse af yngle- eller rasteområder jævnfør artikel 12(1)(d) i habitatdirektivet.

Forsættelig drab og forstyrrelse af hvidnæse

Generelt kan man kun forvente en eventuel lille forekomst af hvidnæser inden for projektområdet. Uddybning og oprensning i delområde S6 i Sælhundeholm Løb er ikke af en sådan karakter, at det kan medføre drab på hvidnæser og det vurderes ikke, at eventuelle hvidnæser i området vil forsætlig forstyrres som følge af projektet. Det vurderes på den baggrund at den økologiske funktionalitet opretholdes for arten.

Beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder

Yngle- og rasteområder er generelt ukendte for hvidnæser. Der forekommer yngleadfærd i dansk farvand (Kattegat og Bælthavet), men der er ikke udpeget yngleområder i nærheden af projektområdet. Derudover er projektet ikke af sådan en karakter, at det vil beskadige eller ødelægge yngleområder for hvidnæse, hvilket derfor udelukkes.


C.3 Øresvin

C.3.1 Eksisterende forhold

Øresvin (*Tursiops truncatus*) er en kystart. Den forekommer i spredte bestande med periodiske knopskydninger fra sit udbredelsescentrum. Helt frem til 1950'erne var øresvinet ret almindeligt i den sydlige Nordsø, hvorefter arten trak sig tilbage til Den Engelske Kanals vestlige ende. Siden begyndelsen af 1990'erne har øresvinet igen fundet vej ind i Nordsøen (Kinze C. C., 2024).

De øresvin, der forekommer i danske farvande, er en del af bestanden i Nordsøen, som ikke kan opdeles i særskilte nationale bestande. Arten har formentlig ikke en fast, ynglende bestand i danske farvande, men der vides meget lidt om artens adfærd i de danske farvande. Seneste optælling af øresvin fra 2022, der hører til bestanden i Nordsøen er også udført i forbindelse med SCANS-undersøgelser (Gilles, A., et al., 2023). Optællingerne viser, at der ikke er optalt øresvin nær projektområdet, men at der er en stabil samlet forekomst ved den engelske østkyst i Nordsøen.

Der forefindes ikke et decideret udbredelseskort for øresvin, men kort over observationer og overvågningsindsatser viser, at de hyppigst forekommer både på den østlige og vestlige engelske kyst samt længere sydpå langs den hollandske, franske og portugisiske og spanske kyst, jf. Figur C-3.



Figur C-3 Observationer samt overvågningsindsats af øresvin i Nordsøen. Øresvin (røde markeringer) fra (Gilles, A., et al., 2023).

Yngle- og rasteområder er generelt ukendte for øresvin, men ud fra ovenstående SCANS-undersøgelser, hvor de fleste øresvine er observeret ud fra den engelske østkyst samt kysterne længe mod den sydlige del af Europa, vurderes der ikke at være yngle- eller rasteområder i uddybningsområdet og området i umiddelbar nærhed heraf.

C.3.2 Vurdering af påvirkninger

Uddybningsområdet i Sælhundeholm Løb og området i umiddelbar nærhed heraf er ikke et vigtigt område for øresvin. Øresvin er, som andre marine pattedyr,

sårbare over for undervandsstøj, særligt fra anlægsaktiviteter, hvis der nedrammes pælefundamenter, som genererer meget store lydtryk under vandet. Det skyldes, at øresvin benytter ekkolokalisering til fødesøgning og kommunikation. Høreskader kan dermed være fatale for øresvin.

Forsættelig drab og forstyrrelse af øresvin

Da der ikke er tale om aktiviteter, der udsender impulsstøj men derimod lavfrekvent støj fra uddybningsfartøjerne, vurderes det, at der ikke vil være tale om drab af individer. Det kan være, at hvis der er øresvin i området, at de vil flytte sig midlertidigt fra det område, hvor der uddybes. Men eftersom området i forvejen er præget af skibstrafik, vurderes det at øresvin i området er tilpasset til skibstrafikken. Dermed konkluderes det, at der ikke vil ske en forsættelig forstyrrelse af individerne.


Beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder

Endvidere skal det sikres, at yngleområder ikke påvirkes i en grad, hvor øresvins økologiske funktionalitet svækkes. Den økologiske funktionalitet betyder, at yngle- og rasteområder skal bevares af hensyn til bestanden af øresvins evne til at nå eller opretholde en levedygtig bestandstørrelse samt have potentiale for at nå og opretholde en gunstig bevaringsstatus for hele arten. Menneskelig aktivitet må derfor ikke beskadigelse af yngle- eller rasteområder. Uddybningsperioden er midlertidig og omfatter maks. 24-28 døgn med et uddybningsfartøj (COWI, 2024). Endvidere vurderes uddybningsområdet i delområde S6 i Sæl-hundeholm Løb ikke at være et egnet yngle- eller rasteområde for øresvin, hvorfor det konkluderes, at projektet ikke vil beskadige yngle -eller rasteområder og dermed heller ikke hindre opretholdelse den økologiske funktionalitet for øresvin.

C.4 Vågehval

C.4.1 Eksisterende forhold

Vågehval (*Balaenoptera acutorostrata*) er den mest almindelige bardehval med en verdensbestand på 700.000-1.400.000 individer (Kinze C. , 2022). Vågehvalen findes stort set i hele verden både kystnært og i åbent hav. Den observeres hyppigt i det nordlige del af Nordsøen og sporadisk i Skagerrak, se Figur C-4. I Kattegat og øvrige dele af de indre danske farvande forekommer arten sjældent (Kinze C. , 2022; Baagøe & Jensen, 2007; Kyhn et al., 2021a; Gilles et al., 2023).



Figur C-4 SCANS-overvågning af vågehvaler i 2022, observationer er angivet med rød (Gilles et al., 2023).

Vågehvaler kommer hver sommer ind i Skagerrak. Af de få forekomster, der er registreret af vågehvaler i dansk farvand mellem 2003-2022 er der flest observationer i maj, juni og juli. Der er aldrig registreret vågehval i dansk farvand i februar til og med april (Naturbasen, 2022).

I perioden fra 1984 til 2022 kendes til færre end 15 observationer samt tre strandinger af vågehval i indre danske farvande (Naturbasen, 2022; Baagøe & Jensen, 2007). Parring finder sted om vinteren, hvor vågehvalen befinder sig på sydlige breddegrader langs den Amerikanske kyst (Naturbasen, 2022). Ungerne fødes efter en drægtighedsperiode på ca. 10 måneder og dier i ca. 4-5 måneder.

Vågehvaler i dansk farvand tilhører Nordsøbestanden, som formentligt også bruger en større del af Nordatlanten ifm. føde og reproduktionsvandring. Da

vågehvaler er sjældne i de danske farvande, vides der generelt meget lidt om artens adfærd og årstidsmæssige variationer i forekomst (Kyhn et al., 2021a).

C.4.2 Vurderinger af påvirkninger

Som udgangspunkt skal det sikres, at yngleområder ikke påvirkes i en grad, hvor vågehvalens økologiske funktionalitet svækkes. Den økologiske funktionalitet betyder, at yngle- og rasteområder skal bevares for at vågehvalbestandens evne til at nå eller opretholde en levedygtig bestandstørrelse med potentialet til at nå og opretholde en gunstig bevarelsesstatus for hele arten. Der må således ikke ved menneskelig aktivitet ske en beskadigelse af yngle- eller rasteområder jævnfør artikel 12(1)(d) i habitatdirektivet.

Forsætlig drab og forstyrrelse af vågehval

Uddybning og oprensning i delområde S6 i Sælhundeholm Løb er ikke af en sådan karakter, at det kan medføre drab på vågehvaler. Grundet vågehvalens ringe forekomst vurderes det ikke, at projektet vil medføre forsætlig forstyrrelse af vågehvaler. Det vurderes på den baggrund at den økologiske funktionalitet opretholdes for arten.

Beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder

Vågehvalens yngle- og rasteområder befinder sig ikke i eller i nærheden af projektet, da de yngler langs den amerikanske kyst. Uddybning og oprensning af sediment er ej heller af en karakter, som vil beskadige eller ødelægge yngleområder for vågehval, hvilket derfor udelukkes.